BIBLIOTECA NAZ.
Vittorio Emanuele III
XVIII
B
63
NAPOLI

Digitized by Google

ENTOMOLOGIA
PARISIENSIS;

SIVE

CATALOGUS Inſectorum quæ in Agro Pariſienſi reperiuntur;

SECUNDUM methodum Geoffræanam in ſectiones, genera & ſpecies diſtributus:

CUI addita ſunt nomina trivialia & fere trecentæ novæ Species.

Edente A. F. DE FOURCROY, Doct. Med. Pariſ.; è Reg. Scientiar. Academ.; è Reg. Soc. Medic. &c.

PARS PRIMA.

PARISIIS,
VIA ET ÆDIBUS SERPENTINEIS.

M. DCC. LXXXV.

SUB PRIVILEGIO ACADEMIÆ.

B. R. NEAPOLIS
BIBLIOTECA NAZIONALE

LECTORI ENTOMOPHYLO

MONITUM EDITORIS.

JAM à viginti annis prodiit celeb. Geoffroy de inſectis opus eximium, quod multo favore proſecuti ſunt hiſtoriæ naturalis cultores. Dudum à plurimis expectabatur manuale Compendium quod nomenclaturam & methodum complectens, omiſſâ ſcilicet hiſtoricâ parte, rus deferri poſſet. Non ergo ingratum entomophylis fore arbitratus eſt illuſtr. autor, ſi catalogus inſectorum quæ circà Pariſios reperiuntur typis parvâ formâ mandaretur, Botanicon Pariſienſis ad inſtar. Feliciſſimæ apud cives ſuos praxeos medicæ curis diſtractus, hoc quod ſuſceperat opus omnino abſolvere non potuit. Entomologiæ olim deditus & autoris auxilio fretus, hunc catalogum

publici juris facere non timui. Methodum ill. Geoffroy, genera, ſpecies, deſcriptivas ſententias, religioſè ſervavi. Trivialia, ſæpius Linneana, ipſe autor addidit, quæ in magno opere (1) *neglexerat. Hâc ſimul datâ occaſione quædam in methodo ſuâ emendavit, adjecit plurima. Sic genus Eulophi poſt Tenthredines omnino omiſſum eſt, cum ſedulâ attentione factâ, Eulophus nihil aliud ſit quàm verus Cynips antennis ramoſis. Hinc inſectum illud inter cynipes nunc incedit. Præterea multæ à viginti annis novæ in agro Pariſienſi detectæ ſunt inſectorum ſpecies, quæ ad ſua quæque genera revocatæ ſunt; ſed ut novæ illæ ſpecies quæ ducentum & quinquaginta ſuperant à cæteris in hiſtoriâ Inſectorum in-4°. deſcriptis*

(1) Hiſt. abreg. des Inſectes, par M. Geoffroy, 2 vol. in-4°. Paris, 1764.

diſtinguantur, ſingulas aſterico notandas curavi. Specierum dimenſiones, & habitationum loca adjeci; ſic ergo quoad numerum ſpecierum & nomenclaturam hic catalogus multo auctior & emendatior magno opere in-4°. prodit, & hanc illuſtrationem celeb. Geoffroy omnino deberi fateor. Levia quædam vel addidi, vel mutavi tantum, quæ hìc commemorare ſupervacuum duco; ſimplicis igitur editoris munus ſuſcepi, utilitatis potiùs quàm gloriæ ſpe ductus.

Dabam Lutetiæ, menſe apr. 1785.

Insectorum Divisio generalis.

Inſecta dividuntur in ſex ſectiones.

Sectio I. *Coleoptera*, quorum alæ coleoptris ſeu elytris teguntur & quibus eſt os maxilloſum.

Sectio II. *Hemiptera*, quorum alæ ſuperiores elytris accedunt, & quorum os ſub thorace eſt inflexum.

Sectio III. *Tetraptera alis farinaceis*, quibus ſunt quatuor alæ ſquamulis tectæ.

Sectio IV. *Tetraptera alis nudis*, quibus alæ quatuor ſunt membranaceæ.

Sectio V. *Diptera*, quibus ſunt alæ duæ & halteres ſub alarum origine.

Sectio VI. *Aptera*, quæ carent alis.

Prima autem ſectio, coleopterorum ſcilicet, cum maxime numeroſa ſit, in articulos & ordines diſpertitur.

Articulus primus inſecta coleoptera comprehendit quæ coleoptra gerunt integra & dura.

Articulus ſecundus ex iis componitur quorum coleoptra dura ſunt, ſed dimidiata, ſeu ſemiſecta ita ut abdomen non omnino tegant.

Articulus tertius ea exhibet inſecta, quorum coleoptra mollia ſunt & membranacea.

Ex iis articulis quiſque in varios ordines dividitur, prout tarſi inſectorum varium referunt articulorum numerum, duos nempe, tres, quatuor aut quinque articulos, vel quinque in primo & ſecundo pedum pari, quatuor verò in poſteriore.

ERRATUM.

Pag. 82, *lin.* 8, tribus *lege* tibiis.

EXTRAIT *des regiſtres de l'Académie des Sciences.*

Du 13 Juillet 1785.

LES Commiſſaires nommés par l'Académie, lui ayant rendu compte d'un Ouvrage de M. DE FOURCROY, intitulé : *Entomologia Pariſienſis*, elle a jugé cet Ouvrage digne de ſon approbation, & de paroître ſous ſon Privilège.

Je certifie le préſent extrait conforme à l'original & aux regiſtres de l'Académie. Le 13 Juillet 1785.

Signé, le Marquis DE CONDORCET.

EXTRAIT *des regiſtres de la Société Royale de Médecine.*

LA Société Royale de Médecine ayant entendu, dans la ſéance tenue au Louvre le 23 Juin préſent mois, la lecture d'un rapport très-avantageux fait par MM. GEOFFROY & MAUDUYT, ſur un Ouvrage de M. DE FOURCROY, intitulé : *Entomologia Pariſienſis, ſive Catalogus Inſectorum quæ circa Lutetiam reperiuntur, &c.* a penſé que cet Ouvrage étoit très-digne de ſon approbation. En foi de quoi j'ai ſigné le préſent. A Paris, ce 28 Juin 1785.

Signé, VICQ D'AZIR, Secrétaire perpétuel.

ENTOMOLOGIA

ENTOMOLOGIA
PARISIENSIS.

PRIMA SECTIO INSECTORUM.
INSECTA COLEOPTERA.

Caracteres ſectionis.

Abdomen elytris duris tectum.
Maxillæ corneæ laterales.

ARTICULUS PRIMUS.

Caract. articuli I.

Elytra integra dura.

ORDO PRIMUS.

Caract. Ordin. I.

Tarſorum articuli quinque.

I. PLATYCERUS. *Le Cerf-volant.*

Antennæ in extremo uno verſu pectinatæ.

Familia I. *Antennis fractis.*

1. P. Cervus.

Le grand Cerf-volant.

Longueur 21 lignes. Largeur 7 lignes.

P. fuſcus, cornubus duobus mobilibus, aſpice bifurco, intus ramo denticuliſque inſtructis.

Locus. Habitat ſilvas & præcipue ilices.

2. P. fœmina cervi.

La grande Biche.

Long. 16 lig. Larg. 6 lig.

P. fuſcus, elytris lævibus, capite lævi.

Loc. Larva carie exeſos fraxinorum truncos habitat.

3. P. parallelipipedus.

La petite Biche.

Long. 9 lig. Larg. 4 lig.

P. niger, elytris lævibus, capitis puncto duplici prominente.

Loc. Habitat arbores carioſas.

4. P. caraboides.

La Chevrette bleue.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

P. violaceo-cœruleus, elytris lævibus.

Varietas A. Platycerus caraboides latior, ſuperne viridis, inferne fuſcus. *La Chevrette verte.*

Loc. Habitat eaſdem arbores.

FAMIL. II. *Antennis integris.*

5. P. ſtriatus.

La Chevrette brune.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

P. fuſcus, capite & thorace punctatis; elytris punctato-ſtriatis.

Loc. Habitat vetuſtas arbores.

* 6. P. pygmæus.

Le Cerf-volant mignonette.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

P. nigro fuſcus, elytris ſtriatis, pedibus fuſcis, capite brevi, antennis vix apparentibus.

Loc.

II. PTILINUS. *La Panache.*

Antennæ ſecundùm totam longitudinem uno verſu pectinatæ.

1. P. fuſcus.

La Panache brune.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

P. atro-fuſcus, thorace convexo, pedibus antenniſque pallidis.

Loc. Habitat vetuſtas ſalices quas rotundis foraminibus larva terebrat.

2. P. flaveſcens.

La Panache jaune.

Long. 2 ½ lig. Larg. 1 lig.

P. niger, ſubvilloſus, thorace plano marginato, elytris flavis mollioribus.

Loc. Habitat flores apertos.

III. SCARABÆUS. *Le Scarabé.*

Antennæ clavatæ, clavâ lamellatâ; ſcutellum inter elytrorum origines.

FAMIL. I. *Antennarum lamellis ſeptem.*

1. S. naſicornis.

Le Moine.

Long. 15 lig. Larg. 9 lig.

S. capite unicorni recurvo, thorace gibbo, abdomine hirſuto.

Loc. Habitat humum recentem (*les couches*) & arborum cariem.

2. S. fullo.

Le Foulon.

Long. 17 lig. Larg. 7 lig.

S. antennarum lamellis maximis, corpore nigro, ſquammis albis, varie maculato.

Loc. Habitat meridionales Galliæ provincias; in muſæis frequens.

3. S. melolontha.

Le Hanneton.

Long. 1 pouce. Larg. 6 lig.

S. teſtaceus, thorace villoſo, abdominis inciſuris lateralibus albis, caudâ inflexâ.

Loc. Habitat arbores.

FAMIL. II. *Antennarum lamellis tribus.*

4. S. typhæus.

Le Phalangiſte.

Long. 8 lig. Larg. 4 ½ lig.

S. niger, elytris ſtriatis, thorace antrorſum tricorni.

Loc. Habit. bovinas fæces, gallicè *Bouzes de vaches*.

5. S. auratus.

L'Eméraudine.

Long. 9 lig. Larg. 5 lig.

S. viridi-ænæus, thoracis parte pronâ, antice prominente.

Loc. Habitat flores præcipue roſæ & pæoniæ.

6. S. nobilis.

Le Verdet.

Long. 7 lig. Larg. 4 lig.

S. viridis nitens, thorace infra æquali, non prominente.

Loc. Habitat flores umbellatos.

7. S. autumnalis.

Le petit Hanneton d'automne.

Long. 7 lig. Larg. 3 ½ lig.

S. teſtaceus, thorace villoſo, elytris luteo-

pallidis, lineis tribus elevatis pallidioribus.

Varietas A. Scarabæus autumnalis omnino viridis.

Loc. Habitat circa arbores.

8. S. horticola.

Le petit Hanneton à corcelet vert.

Long. 4 lig. Larg. 2 $\frac{2}{3}$ lig.

S. capite thoraceque cœruleo piloſo; elytris rufis.

Loc. Habitat bovinas fæces.

9. S. ſtercorarius.

Le grand Pilulaire, le fouille-merde.

Long. 10 lig. Larg. 5 lig.

S. ater, dorſo glabro, elytris ſulcatis; capitis clypeo rhomboide, centro prominulo.

Loc. Habitat bovinas fæces.

10. S. vernalis.

Le petit Pilulaire.

Long. 7 lig. Larg. 5 lig.

S. cœruleſcens, dorſo elytriſque glabris læviſſimiſque, capitis clypeo rhomboide, centro prominulo.

Loc. Habitat bovinas fæces.

11. S. ſubterraneus.

Le Scarabé perlé.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

S. ater, punctis elevatis, per ſtrias digeſtis.

Loc. Habitat arenam ſterilem; in urbe *Fontainebleau* frequens.

12. S. hæmipterus.

Le Scarabé à tarrière.

Long. 4 lig. Larg. 2 lig.

S. ater depreſſus & ſquamoſus, maculis albis variegatus, elytris abdomine brevioribus, fæmina aculeo ani.

Loc. Habitat arbores exeſas & cortices.

13. S. argenteus.

L'Ecailleux violet.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig. $\frac{3}{4}$.

S. violaceus & ſquamoſus, ſquamis ſubtus argenteis.

Loc. Habitat exeſos arborum truncos.

14. S. funerarius.

Le Drap mortuaire.

Long. 5 lig. Larg. 3 lig.

S. nigro-cœrulescens, maculis albis ſparſis, ordine macularum abdominalium longitudinali.

Loc. Habitat umbelliferarum flores.

15. S. marginatus.

Le Scarabé à bordure.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

S. niger, elytris croceis margine nigro.

Loc.

16. S. faſciatus.

La Livrée d'ancre.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 3 lig.

S. niger hirſutie-flavus, elytris luteis, faſciis tribus nigris interruptis.

Loc. Habitat flores umbellatos.

17. S. villoſus.

L'Arquelin velu.

Long. 4 lig. Larg. 2 lig.

S. villoſus albo, nigro flavoque irregulariter variegatus.

Loc.

18. S. bicolor.

Le Scarabé bedeau.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

S. capite thoraceque nigro, antennis elytriſque rubris.

Loc. Larva & Scarabæus fæces bovinas habitat.

19. S. fimetarius.

Le Scarabé gris des bouzes.

Long. 1, 2, 3 lig. Larg. ½ 1, 1 ½ lig.

S. capite thoraceque nigro glabro, elytris griſeis, pedibus pallidis.

Loc. Abundat in bovinis fæcibus.

20. S. foſſor.

La Tête armée.

Long. 2, 3, 4, 5 lig. Larg. 1, 2, 2 ½ lig.

S. totus niger, ſpinulis tribus capitis tranſverſim poſitis.

Loc. Abundat in bovinis fæcibus.

21. S. gagatinus.

Le Scarabé jayet.

Long. 4 lig. Larg. 2 lig.

S. totus niger, capite inermi.

Loc. Habitat bovinas fæces.

22. S. fulveſcens.

Le Scarabé fauve aux yeux noirs.

Long. 3 ½ lig. Larg. 1 ½ lig.

S. fulvus, oculis nigris, thorace glabro.
Loc. Habitat arbuſta ſepium.

23. S. atratus.
Le Velours noir.
Long. 2 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.
S. niger hirſutus.
Loc. In horto regio Pariſienſi frequens.

24. S. fumoſus.
Le Scarabé couleur de ſuie.
Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.
S. ater, thorace ſubvilloſo, elytris fuſcis ſtriatis.
Loc.

25. S. lamellatus.
Le Scarabé brun chagriné.
Long. 4 lig. Larg. 2 lig.
S. atro-fuſcus, ſupra veluti cineraſcens, antennis pedibuſque fuſcis, lamellis antennarum longis, elytris ſtriatis.
Loc.

26. S. aquaticus.
Le Scarabé noir des marais.
Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

S. piceus.

Loc. Habitat putridas paludum aquas.

27. S. natator.

Le Scarabé nageur.

Long. 2 lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

S. totus rufo-niger, maculis nigrioribus.

Loc. Habitat rivulos & aquas.

28. S. perla.

La Perle aquatique.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

S. ſubrotundus lucidus, capite thoraceque nigro, elytris pallidis pellucidis.

Loc. Habitat rivulos.

29. S. putridus.

Le petit Scarabé noir ſtrié.

Long. $\frac{3}{4}$ lig. Larg, $\frac{1}{3}$ lig.

S. niger, pedibus rufis, elytris profunde ſtriatis.

Loc. Habitat putridas plantas.

30. S. florilegus.

Le petit Scarabé des ſleurs.

Long. $\frac{1}{2}$ lig.

S. nigro-cœruleſcens.

Loc. Habitat flores.

* 31. S. ſulcatus.

Le Scarabé à côtes.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg, 1 $\frac{2}{3}$ lig.

S. ater, ſupra coſtis elevatis ſtriatis.

Loc.

IV. COPRIS. *Le Bousier.*

Antennæ clavatæ, clavâ lamellatâ. Scutellum inter elytrorum origines nullum.

1. C. lunaris.

Le Bouſier capucin.

Long. 8 lig. Larg. 4 $\frac{2}{3}$ lig.

C. capitis clypeo lunulato, margine elevato, corniculo denticulato.

Loc. Habitat fimetaria & bovinas fæces rar.

2. C. ſerratus.

Le Hottentot.

Long. 7 lig. Larg. 5 lig.

C. niger; capite clypeato, margine ſerrato, thorace lato lævi; elytris ſtriatis.

Loc. Habitat bovinas fæces; rar. in agris lutetianis.

3. C. nuchicornis.

Le petit Bouſier noir cornu.

Long. 3 $\frac{1}{2}$, 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2, 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. fuſco-niger, capite clypeato angulato, pone cornuto, elytris ferrugineo-nebuloſis, brevibus, ſtriatis.

Loc. Habitat bovinas fæces.

4. C. acornis.

Le petit Bouſier noir ſans cornes.

Long. 2, 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1, 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. fuſco-niger, capite clypeato augulato, non cornuto, elytris brevibus, ſtriatis.

Loc. Habitat bovinas fæces.

5. C. conſpurcatus.

Le Bouſier à deux cornes.

Long. 4 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

C. obſcure ænæus, capite pone bicorni, thorace antice prominente, elytris rufis nigro maculatis.

Loc. Habitat bovinas fæces.

6. C. fulvus.

Le Bouſier fauve.

Long. 2, 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$, 2 lig.

C. fulvus, capite ænæo, thoracis utrinque cavitate laterali fuſcâ.

Loc. Habitat bovinas fæces.

7. C. hæmorrhoidalis.

Le Bouſier à points rouges.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

C. niger nitidus, thorace antice gibbo duplici, elytro ſingulo maculâ duplici rubrâ.

Loc. Habitat bovinas fæces.

8. C. ſinuatus.

Le Bouſier à couture.

Long. 5 lig. Larg. 4 lig.

C. niger, capite clypeato, elytris margine exteriore ſinuatis.

Loc. Habitat bovinas fæces.

9. C. arachnoides.

Le Bouſier araignée.

Long. 4 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

C. niger, pedibus longis, femorum poſteriorum baſi denticulatâ, elytris poſtice gibbis.

Loc. Idem.

10. C. corniger.

Le Bouſier à cornes retrouſſées.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

C. niger, capite pone bicorni, cornicu-lis tenuibus arcuatis, longitudine thoracis, thorace utrinque ſinuato.

Loc. Habitat bovinas fæces.

V. ATTELABUS. *L'Escarbot.*

Antennæ clavatæ, clavâ integrâ, in medio fractæ.

Caput intra thoracem.

1. A. unicolor.

L'Eſcarbot noir.

Long. 1, 3, 4 lig. Larg. 1, 2, 3 lig.

A. totus niger, elytris lævibus nonnihil ſtriatis.

Loc. Habitat identidem fæces bovinas, *ſæpius* glaream ſterilem.

2. A. bimaculatus.

L'Eſcarbot à taches rouges.

Long. 1, 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1, 1 $\frac{1}{4}$ lig.

A. niger, elytro ſingulo macula rubra.

Loc. Cum præcedent.

3. A. cupreus.

L'Eſcarbot bronzé.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

A. nigro-cupreus, capite nonnihil prominulo.

Loc. Cum præcedent.

VI. DERMESTES. *Le Dermeste.*

Antennæ clavatæ perfoliatæ, ultimo articulo ſolido gibboſo.

Elytra non marginata.

1. D. veſpillo.

Le Dermeſte à point d'Hongrie.

Long. 9 lig. Larg. 4 lig.

D. thorace marginato, elytris abſciſſis, nigris, faſciis duabus tranſverſis undulatis luteis.

Loc. Habitat cadavera putrida.

2. D. Liſterianus.

Le grand Dermeſte noir.

Long. 14 lig. Larg. 6 lig.

D. thorace marginato, elytris abſciſſis, totus niger.

Loc. Cum præcedente, rarior.

3. D. bipunctatus.

Le Dermeſte à 2 points rouges.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

D. niger, coleoptris punctis rubris binis.

Loc. Putrida cadavera habitat.

4. D. pellio.

Le Dermeſte à 2 points blancs.

Long. 2, 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

D. niger, coleoptris punctis albis binis.

Loc. Habitat hortos & domos.

5. D. lardarius.

Le Dermeſte du lard.

Long. 3 lig.

D. niger, elytris antice cinereis.

Loc. Habitat partes animalium putridas, muſæis ubi pelles conſervantur infeſtus.

6. D. pallidus.

Le Dermeſte effacé.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

D. nigro-fuſcus, elytris antice pallidioribus nebuloſis.

Loc. Habitat partes animalium putridas, muſæis ubi pelles conſervantur infeſtus.

7. D. murinus.

Le Dermeſte à écuſſon jaune.

Long. 2, 3 lig. Larg. 1 lig.

D. lævis niger, cinereo-nebuloſus, ſcutello luteo.

Loc. Cadavera & exeſas arbores habitat.

8. D. flaveſcens.

Le Velours jaune.

Long. 2 lig.

D. flaveſcens piloſus, oculis nigris.

Loc. Habitat lignum exeſum.

9. D. oblongus.

Le Dermeſte levrier à ſtries.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

D. oblongus fuſcus, elytris ſtriatis.

Loc. Habitat ligneas ſupellectiles in domis.

10. D. contractus.

Le Dermeſte levrier ponctué & ſtrié.

D. oblongus ferrugineus; elytris punctato-ſtriatis.

Loc. Habitatio præcedentis.

11. D. auriculatus.

Le Dermeſte à oreilles.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

D. tentaculis antè oculos antenniformibus mobilibus.

Loc. Vere novo in aquas natat.

12. D. ſtercoreus.

Le Dermeſte du fumier.

Long. $\frac{1}{2}$ lig.

D. oblongus, glaber, teſtaceus, oculis nigris.

Loc. Fimetaria habitat, identidem in domis reperitur.

13. D. variegatus.

Le Dermeſte panaché.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

D. nigro fuſcoque nebuloſus, elytris vix ſtriatis.

Loc. Habitat cortices carioſos.

14. D. ſtriatus.

Le Dermeſte à côtes.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

D. nigro fuſcoque nebuloſus, thorace

elytriſque profundè ſtriatis & punctatis.

Loc. Habitat vetuſtas arbores.

15. D. aquaticus.

Le Dermeſte bronzé.

Long. 1 $\frac{1}{2}$, 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$, 1 $\frac{3}{4}$ lig.

D. viridi-æneus, thorace faſciis quatuor elevatis, elytris punctato-ſtriatis.

Loc. Confervas rivorum habitat.

16. D. 4-punctata.

Le Dermeſte à 4 points rouges, ſtrié.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

D. niger, coleoptris punctis rubris quaternis, elytris ſtriatis oblongus.

Loc. Habitat arbores; rarus.

17. D. hortenſis.

Le Dermeſte à 4 points rouges, ſans ſtries.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

D. niger, coleoptris punctis rubris quaternis, elytris lævibus ſubrotundus.

Loc. Habitat arbores in ſylvis & hortis.

18. D. gagatinus.

Le Dermeſte jayet.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

D. niger ſubrotundus elytris lævibus.
Loc. Habitat flores.

19. D. lugubris.

Le Dermeſte en deuil.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

D. niger ſubrotundus, elytris ſtriatis.
Loc. Habitat plantas aquaticas.

20. D. longicornis.

Le Dermeſte noir à longues antennes.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

D. niger ſubrotundus, elytris lævibus, antennis thorace longioribus.
Loc. Habitat flores.

21. D. fulvipes.

Le Dermeſte noir à pattes fauves.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

D. niger oblongus, elytris punctatis, pedibus fulvis.
Loc. Habitat flores.

22. D. pellucidus.

Le Dermeſte à étuis tranſparens.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

D. elytris corneis pellucidis, thorace obſcuriore.

Loc. Habitat umbelliferarum flores.

* 23. D. ſuturatus.

Le Dermeſte à couture.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

D. totus niger, ſubrotundus, thorace elytriſque profunde ſtriatis & punctatis.

Loc.

* 24. D. triſulcus.

Le Dermeſte à tête noire.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

D. oblongus, fuſcus capite nigro, thorace coſtis tribus elevatis, elytris ſtriatis.

Loc.

* 25. D. faſciatus.

Le Dermeſte à bande noire.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

D. oblongus, niger, pedibus coleoptriſque fulvis, elytrorum faſciâ tranſversâ nigra.

Loc.

* 26. D. ſcapularis.

Le Dermeſte à épaulettes.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

D. capite thoraceque rubro, elytris nigris, maculis antice extuſque rubris.

Loc.

* 27. D. pygmæus.

Le Dermeſte puce.

Long. $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

D. ovatus teſtaceus, ſubpiloſus oculis nigris.

Loc.

* 28. D. thoracicus.

Le Dermeſte puce à corcelet rouge.

Long. $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

D. ovatus, capite, thorace pedibuſque rubicundis, elytris nigris.

Loc.

* 29. D. teſtudinarius.

Le Dermeſte-tortue noire.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

D. niger nitens ovatus, elytris poſtice lividis.

Loc.

* 30. D. tricolor.

Le Dermeſte-tortue à tache rouge.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

D.

D. niger nitens ovatus, elytris poſtice, antice maculâ rubrâ.

Loc.

* 31. D. teſſelatus.

Le Dermeſte à l'échiquier.

Lon. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

D. niger; maculis fuſcis, plurimis connexis, elytris punctatis.

Loc.

* 32. D. ſemi-coleopterus.

Le Dermeſte noir à étuis courts.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

D. ater, elytris marginatis brevibus, pedibus fuſcis.

Loc.

* 33. D. dimidiatus.

Le Dermeſte à demi-étuis.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

D. niger, elytris dimidiatis pene flavis.

Loc.

VII. BIRRHUS. *La Vrillette.*

Antennæ articulis tribus ultimis longiſſimis ſemi-clavatæ.

1. B. domeſticus.

La Vrillette des tables.

Long. 1 $\frac{1}{2}$, 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ lig.

B. teſtaceo-niger, thorace ſubhirſuto.

Loc. Ligneas ſuppelectiles foraminibus rotundis terebrat.

2. B. paniceus.

La Vrillette de la farine.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

B. teſtaceus glaber oculis nigris.

Loc. Habitat cerealia.

3. B. mollis.

La Vrillette fauve.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

B. fulvus obſcurus, oculis nigris.

Loc. Habitat pinum.

4. B. pertinax.

La Vrillette ſavoyarde.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

B. totus nigro-fuſcus.

Loc. Habitat ligna tabulata domorum.

5. B. faſciatus.

La Vrillette brune à bandes griſes.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

B. fuſcus, faſciis elytrorum tranſverſis cinereis.

Loc.

6. B. cœruleſcens.

La Vrillette bleuâtre.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

B. totus nigro-cœruleus ſubvilloſus.

Loc.

VIII. ANTHRENUS. *L'Anthrêne.*

Antennæ clavatæ integræ, clavâ ſolidâ compreſſâ.

1. A. ſcrophulariæ.

L'Anthrêne à broderie.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

A. ſquamoſus niger, faſciâ punctiſque coleoptrorum albis, ſuturis fuſcis.

Loc. Habitat flores, multiplex.

2. A. florilegus.

L'Amourette.

Long. $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

A. ſquamoſus niger, elytris fuſcis, faſciâ triplici undulatâ albâ.

Loc. Larva cadavera habitat, alatus flore

IX. CISTELA. *La Cistele.*

Antennæ extrorſum craſſiores nonnihil perfoliatæ.

Thorax conicus non marginatus.

1. C. virideſcens.

La Ciſtele ſatinée.

Long. 4 lig. Larg. 2 $\frac{2}{3}$ lig.

C. ſubvilloſa virideſcens, faſciis longitudinalibus fuſcis interruptis.

Loc. Habitat arenam & gramina.

2. C. atra.

La Ciſtele à bande.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

C. ſubvilloſa atra, faſciâ elytrorum tranſverſâ aurato-fuſcâ.

Loc.

3. C. nitens.

La Ciſtele noire liſſe.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. nigra nitens glabra.

Loc.

X. PELTIS. *Le Bouclier.*

Antennæ extrorſum craſſiores nonnihil perfoliatæ.

Thorax & elytra marginata.

1. P. atrata.

Le Bouclier noir à trois raies & corcelet liſſe.

Long. 4, 5, 6 lig. Larg. 2, 3, 4 lig.

P. nigra, elytris lineis tribus elevatis, ſpatio interjecto punctato, thorace lævi.

Variet. A. ead. ſpatio interjecto punctato, thorace lævi, utrinque ſulco armato.

B. ead. ſpatio interjecto punctato, thorace lævi, ubique æquali.

C. ead. ſpatio interjecto punctato, thorace lævi, punctis duobus impreſſis.

D. ead. ſpatio interjecto punctis latis inæqualibus, thorace lævi.

Loc. Habitat putrefacta animalium cadavera.

2. P. ſcabra.

Le Bouclier noir à corcelet raboteux.

Long. 5, 6 lig. Larg. 2, 5 lig.

P. nigra, elytris lineis tribus elevatis, ſpatio interjecto minutiſſime punctato, thorace ſcabro.

Loc. Habitat cadavera, rarior.

3. P. gibboſa.

Le Bouclier à boſſes.

Long. 9 lig. Larg. 4 lig.

P. nigra, elytris lineis tribus elevatis, primâ & ſecundâ gibboſitate connexis, thorace lævi.

Loc. Habitat cadavera.

4. P. complicata.

Le Bouclier noir chiffoné à corcelet raboteux.

Long. 5 ½ lig. Larg. 2 lig.

P. nigra, elytris lineis tribus elevatis acutis, ſpatio interjecto veluti complicato, thorace ſcabro.

Loc. Habitat cadavera.

5. P. inæqualis.

Le Bouclier noir chiffonné à corcelet liſſe.

Long. 1 lig. Larg. 2 lig.

P. nigra, elytris lineis tribus elevatis acutis, ſpatio interjecto veluti complicato, thorace lævi.

Loc. Habitat cadavera.

6. P. thoracica.

Le Bouclier à corcelet jaune.

Long. 6 lig. Larg. 2 ½ lig.

P. nigra, lineis tribus elevatis acutis, thorace ferrugineo.

Loc. Habitat cadavera.

7. P. maculata.

Le Bouclier jaune à taches noires.

Long. 6 lig. Larg. 3 lig.

P. nigra, thorace elytriſque teſtaceis, thoracis maculâ coleoptrorumque punctis quinque nigris.

Loc. Habitat cadavera, rarior.

8. P. excavata.

La Goutiere.

Long. 6 lig. Larg. 3 lig.

P. nigra tota, elytris lævibus, punctis minimis excavatis.

Loc. Habitat ligna humida.

9. P. teſtacea.

Le Bouclier fauve.

Long. 2 ½ lig. Larg. 1 ¾ lig.

P. tota teſtacea.

Loc.

10. P. villoſa.

Le Bouclier brun velouté.

Long. 1 ½ lig. Larg. ½ lig.

P. nigro-fuſca ſubvilloſa.

Loc. Habitat arenam.

XI. CUCUJUS. *Le Richard.*

Antennæ ſerratæ breves.
Thorax ſubtus nudus.
Caput dimidium intra thoracem craſſum.

1. C. chryſoſtygma.

Le Richard à foſſettes.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

C. aureus, elytrorum foſſulis quatuor impreſſis nitentibus.

Loc. Habitat excelſas arbores; frequenter in inſula lutetiana *Louvier* dicta reperitur, ad quam cum ligno advehitur, ex ſylvis.

2. C. 8-guttatus.

Le Richard à points blancs.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. viridi-ænæus, punctis quatuor impreſſis albis.

Loc. Idem.

3. C. ruſticus.

Le Richard doré à ſtries.

Long. 7 lig. Larg. 1 lig.

C. viridi-auratus, oblongus, thorace punctato, elytris ſtriatis.

Loc. Habitat arbuſta ſepium.

4. C. rubinus.

Le Richard rubis.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. æneus, elytris fuſcis, thorace rubro faſciis fuſcis.

Loc. Habitat roſas.

5. C. viridis.

Le Richard vert allongé.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. viridi-cupreus, lævi oblongus.

Loc. Habitat arbores ſepium.

6. C. minutus.

Le Richard triangulaire ondé.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. fuſco-cupreus, triangularis, faſciis undulatis villoſo albidis.

Loc. Idem.

* 7. C. ater.

Le Richard noir allongé.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

C. niger oblongus, punctatus, elytris ſtriatis.

Loc.

* 8. C. dentatus.

Le Richard noir chagriné.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

C. niger thorace punctato, poſtice dentato, elytris ſulcatis.

Loc. Habitat inſulas Sequanæ propè locum dictum *le Gros Caillou.*

XII. ELATER. *Le Taupin.*

Antennæ ſerratæ vel filiformes intra capitis cavitatem ſubtus receptæ.

Thorax ſubtus aculeo intra cavitatem abdominis recepto.

1. E. ruber.

Le Taupin rouge.

Long. 8 lig, Larg. 3 lig.

E. thorace elytriſque rubris.

Loc. Habitat carioſas ſalices.

2. E. ſanguineus.

Le Taupin à étuis rouges.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

E. niger, elytris rubris.

Loc. Habitat cortices arborum.

3. E. flaveſcens.

Le Taupin à étuis jaunes & corcelet liſſe.

Long. 5 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

E. niger, elytris flavis.

Varietas A. niger, elytris omnino flavis.

B. niger, elytris flavis apice nigris.

C. niger, elytris teſtaceo-fuſcis.

Loc. Habitat vetuſtas arbores.

4. E. caſtaneus.

Le Taupin à corcelet velouté.

Long. 5 lig. Larg. 1 ½ lig.

E. thorace villoſo, elytris teſtaceis apice nigris.

Varietas A. thorace villoſo, elytris flaveſcentibus apice nigris.

B. thorace villoſo, elytris rubeſcentibus apice nigris.

Loc. Idem.

5. E. ruficollis.

Le Taupin noir à corcelet rouge.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

E. niger, thorace rubro.

Loc.

6. E. cruciatus.

Le Taupin porte-croix.

Larg. 5 lig. Larg. 1 ½ lig.

E. thorace nigro, circulo rubro, elytris fulvis, cruce-nigra.

Loc.

7. E. pectinicornis.

Le Taupin brun cuivreux.

Long. 6 lig. Larg. 2 lig.

E. fuſco-viridi-æneus.

Loc. Habitat gramina.

8. E. niger.

Le Taupin brun nébuleux.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

E. nigro-fuſcus, cinereo-nebuloſus.

Loc. Habitat meſſes.

9. E. teſſellatus.

Le Taupin à plaques velues.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

E. niger, villoſo undulatus.

Loc. Habitat agros.

10. E. murinus.

Le Taupin gris de ſouris.

Long. 4, 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

E. niger, elytris villoſo-murinis.

Loc.

11. E. balteatus.

Le Taupin bedeau.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

E. niger, elytris fuſcis, ſingulo faſciâ longitudinali fulvâ.

Loc. Habitat arva.

12. E. obſcurus.

Le Taupin noir à étuis bruns.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

E. niger, elytris fuſcis.

Loc. Idem.

13. E. ater.

Le Taupin en deuil.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

E. totus niger nitidus.

Loc. Idem.

14. E. rufipes.

Le Taupin noir à pattes fauves.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

E. niger pedibus rufis.

Loc. Habitat cortices.

15. E. bimaculatus.

Le Taupin noir à taches rouges.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

E. niger elytrorum baſi maculis rubris.
Loc. Habitat cortices.

16. E. clavicornis.
Le Taupin à antennes en maſſe.
Long. 1 lig. Larg. ½ lig.
E. fuſcus, antennis ſerrato-clavatis.
Loc. Habitat ſylvas.

* 17. E. rachifer.
Le Taupin à bandes.
Long. 1 ½ lig. Larg. ½ lig.
E. niger, elytris fulvis, rachi nigra.
Loc.

* 18. E. melanophtalmos.
Le Taupin fauve aux yeux noirs.
Long. 3 ½ lig. Larg. 1 lig.
E. fuſcus, oculis nigris.
Loc.

* 19. E. fuſcus.
Le Taupin brunet.
Long. 4 lig. Larg. 1 ½ lig.
E. totus fuſcus, thorace punctato, elytris ſtriatis.
Loc.

* 20. E. villoſus.

Le Taupin brun velouté.

Long. 9 lig. Larg. 2 lig.

E. fulvus vellere levi faſciatim conſperſus.

Loc.

XIII. BUPRESTIS. *Le Bupreste.*

Antennæ filiformes.

Trochanter magnus ſeu appendix ad baſim femorum poſteriorum.

FAMIL. I. *thorace cordato capite latiore elytris anguſtiore.*

1. B. coriaceus.

Le Bupreſte noir chagriné.

Long. 14 lig. Larg. 6 lig.

B. ater, elytris rugoſis.

Loc. Habitat humida hortorum loca.

2. B. nitens.

Le Bupreſte doré & ſilloné à larges bandes.

Long. 11 lig. Larg. 4 lig.

B. viridis, elytris obtuſe ſulcatis, non

punctatis, pedibus antenniſque ferrugineis.

Loc. Habitat frequentiſſimè hortos & agros.

3. B. granulatus.

Le Bupreſte galonné.

Long. 11 lig. Larg. 5 lig.

B. niger, elytris æneis convexe punctatis ſtriatiſque.

Varietas A. totus violaceus, elytris convexe punctatis ſtriatiſque.

Loc. Idem. rarior.

4. B. purpuraſcens.

Le Bupreſte azuré.

Long. lig. Larg. lig.

B. totus nigro-violaceus, elytris denſe ſtriatis.

Varietas A. Elytro ſingulo ſtriis XVI, oris aureo-cupreis.

B. Elytro ſingulo ſtriis XVI, tribus interruptis.

C. Elytro ſingulo ſtriis XXII, tribus interruptis.

Loc. Habitat hortos humidos.

5. B. ſycophanta.

Le Bupreſte quarré couleur d'or.

Long. 7 lig. Larg. 3 lig.

B. nigro-violeſcens, elytris latis æneis è viridi purpureis, ſingulo ſtriis ſexdecim.

Loc. Habitat ilicem, ubi papilionum larvas devorat.

6. B. antiquus.

Le Bupreſte quarré couleur de bronze antique.

Long. 6 lig. Larg. 3 lig.

B. totus è fuſco-viridi cupreus, elytris latis, ſingulo ſtriis ſexdecim.

Loc. Idem.

7. B. leucophtalmos.

Le Bupreſte tout noir.

Long. 8 lig. Larg. 3 $\frac{3}{4}$ lig.

B. ater, elytro ſingulo ſtriis octo lævibus, pedibus nigris.

Loc. Idem.

* 8. B. longicornis.

Le Bupreſte luiſant.

Long. 10 lig. Larg. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

B. ater, elytro ſingulo ſtriis octo lævi-

bus vix impreſſis pedibus nigris, antennis fuſcis, thorace duplo longioribus.

Loc. Idem.

9. B. rufipes.

Le Bupreſte noir à pattes rougeâtres.

Long. 4, 5 lig. Larg. 2 lig.

B. niger, elytro ſingulo ſtriis octo punctatis, pedibus ferrugineis.

Loc. Idem.

10. B. flavipes.

Le Bupreſte noir à pattes jaunes.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

B. niger, elytro ſingulo ſtriis octo lævibus, pedibus lividis.

Loc. Idem.

11. B. vinearum.

Le Bupreſte à ſix points enfoncés.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

B. nigro-viridis, elytro ſingulo ſtriis octo punctis tribus impreſſis.

Loc. Habitat vites.

12. B. agrorum.

Le Bupreſte vert pointillé à huit ſtries & pattes fauves.

Long. 4 lig. Larg. 1 ½ lig.

B. viridis punctatus, elytro ſingulo ſtriis octo, pedibus pallidis.

Loc. Habitat agros.

13. B. lucorum.

Le Bupreſte vert liſſe, à huit ſtries & pattes fauves.

B. viridis nitens; elytro ſingulo ſtriis octo, pedibus pallidis, punctis tribus impreſſis.

Loc. Habitat ſylvas aridas.

14. B. bicolor.

Le Bupreſte à étuis verts & bruns.

Long. 3 lig. Larg. 1 ½ lig.

B. viridis, elytro ſingulo ſtriis octo, pedibus elytrorumque anticâ parte & margine fulvis.

Loc. Habitat arenam.

15. B. 6-punctatus.

Le Bupreſte à étuis cuivreux.

Long. 4 lig. Larg. 1 ½ lig.

B. nitens, capite thoraceque viridi, elytris cupreis punctulis duodecim.

Loc. Habitat arenam, propè rivulos.

16. B. thoracicus.

Le Bupreſte à corcelet cuivreux.

Long.

B. nitens, capite elytriſque viridibus, thorace cupreo, punctis duodecim.

Loc. Idem.

17. B. cyano-cephalus.

Le Bupreſte bleu à corcelet rouge.

Long. 3 lig. Larg. ½ lig.

B. capite elytriſque cæruleis, thorace rubro.

Loc. Idem.

18. B. equeſtris.

Le Chevalier noir.

Long. 3 lig. Larg. 1 ¼ lig.

B. niger, thorace atro, elytris rubris cruce nigrâ.

Loc. In loco dicto *Fontainebleau* frequens.

19. B. crux major.

Le Chevalier rouge.

Long. 3 lig. Larg. 1 ½ lig.

B. niger, thorace pedibuſque rubris elytris rubris, cruce nigra.

Loc.

20. B. crepitans.

Le Bupreſte à tête, corcelet & pattes rouges & étuis bleus.

Long.

B. capite, thorace, pedibuſque rubris, elytris cæruleo-nigris.

Loc. Habitat humum umbroſum, ſub lapidibus.

21. B. uſtulatus.

Le Bupreſte quadrille à corcelet rond & étuis ſtriés.

Long. 1 ½, 2 ½, 3 lig. Larg. ½, 1 lig.

B. niger, thorace ovato, nigro, elytris ſtriatis maculis quatuor lividis.

Loc. Habitat rivorum ripas.

22. B. 4-maculatus.

Le Bupreſte quadrille à corcelet plat & étuis liſſes.

Long. idem. Larg. idem.

B. niger, thorace plano ferrugineo, elytris lævibus, maculis quatuor lividis.

Loc. Idem.

23. B. crucifer.

Le Bupreſte quadrille à corcelet plat, brun & étuis ſtriés.

Long. idem. Larg. idem.

B. niger, thorace plano ferrugineo, elytris ſtriatis, maculis quatuor lividis.

Loc. Idem.

24. B. quadrifer.

Le Bupreſte quadrille à corcelet plat & noir & étuis ſtriés.

B. niger, thorace plano nigro, elytris ſtriatis, maculis quatuor lividis.

Loc. Idem.

25. B. octo-maculatus.

Le Bupreſte noir à huit taches fauves.

Long. 1 lig. Larg. ½ lig.

B. niger, elytris ſtriatis, maculis octo lividis.

Loc. Habitat arenam.

26. B. fulvus.

Le Bupreſte fauve à tête noire.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

B. teſtaceus, capite nigro.

Loc. Idem.

27. B. minutus.

Le Bupreſte noir ſans ſtries.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

B. totus niger, lævis.

Loc. Habitat arenam.

FAMIL. II. *Thorace capite elytriſque anguſtiore.*

28. B. campeſtris.

Le Velours vert à 12 points blancs.

Long. 6 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

B. inauratus, ſupra viridis, coleoptris punctis duodecim albis.

Loc. Habitat loca ſicca, arenam.

* 29. B. epiſcopalis.

Le Bupreſte épiſcopal.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

B.

B. totus violaceus, pedibus antenniſque fuſcis.

Loc. Idem.

30. B. faſciatus.

Le Bupreſte à broderie blanche.

Long. 6 lig. Larg. 2 ½ lig.

B. inauratus, ſupra fuſco-viridis, coleoptris faſciis ſex undulatis albis.

Loc. Idem.

* 31. B. ſuturatus.

Le Bupreſte à bandes.

Long. 1 ½ lig. Larg. ⅔ lig.

B. niger; elytris ſtriatis, coleoptrorum anticâ parte ſuturâque lividis.

Loc.

32. B. germanicus.

Le Bupreſte vert à 6 points blancs.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

B. inauratus, ſupra fuſco-viridis, coleoptris punctis ſex albis.

Loc. Habitat arenam, prope rivulos.

* 33. B. marginatus.

Le Bupreſte bordé.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

B. fulvus, oculis nigris; elytris nigris, poſtice fulvis.

Loc.

34. B. riparius.

Le Bupreſte à mamelons.

Long. 2 $\frac{1}{2}$, 3 lig. Larg. 1 lig.

B. viridi-æneus, elytris punctis latis excavatis mammilloſis.

Loc. Habitat arenam humidam.

* 35. B. ſcapularis.

Le Bupreſte taché à corcele rouge.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

B. teſtaceus, capite nigro : elytris ſtriatis nigris utrinque maculâ antice fulvâ.

Loc.

36. B. aquaticus.

Le Bupreſte à tête cannelée.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{4}{5}$ lig.

B. fuſco-æneus, capite profunde ſtriato, elytrorum ſtriâ primâ remotiſſimâ.

Loc. Habitat arenam humidam.

37. B. contractus.

Le Bupreſte levrier.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

B. niger, elytris fulvis ſtriatis, femoribus latis, pedibus valde ſpinoſis.

Loc.

38. B. impreſſus.

Le Bupreſte à 4 points enfoncés.

Long. 1 $\frac{1}{2}$, 3 lig. Larg. $\frac{1}{2}$, 1 lig.

B. cupreo viridique variegatus, punctis quatuor impreſſis, pedibuſque pallidis.

Loc. Habitat arenam prope rivulos.

* 39. B. lunulatus,

Le Bupreſte à lunules.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg.

B. niger, elytris ſtriato punctatis; poſtice maculis duabus, & apice flavis.

Loc.

40. B. ſtagnorum.

Le Bupreſte bronzé à 2 points enfoncés.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{4}{5}$ lig.

B. fuſco-æneus elytris ſtriatis, punctis duobus impreſſis.

Loc. Habitat arenam humidam, rarior.

* 41. B. foveatus.

Le Bupreſte ſtrié à 4 points enfoncés.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

B. totus niger, elytris ſtriatis, punctis quatuor impreſſis.

Loc.

FAM. III. *Thorace capite latiore, elytrorum latitudine.*

42. B. piger.

Le Bupreſte pareſſeux.

Long. 6 lig. Larg. 3 lig.

B. ater, thorace lato, elytrorum ſtriis punctatis.

Loc. Habitat ſiccam arenam.

* 43. B. capitatus.

Le Bupreſte brun à tête noire.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

B. totus fuſcus, capite nigro.

Loc.

44. B. viridulus.

Le Bupreſte verdet.

Long. 4 lig. Larg. 3 lig.

B. totus viridis, thorace lato.

Loc.

* 45. B. maxilloſus.

Le Quadrille à mâchoires brunes.

Long. 2 $\frac{1}{7}$ lig. Larg. 1 lig.

B. niger maxillis thoraceque ferrugineis: elytris ſtriatis, maculis quatuor luteis.

Loc.

46. B. vulgaris.

Le Bupreſte roſette.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

B. infra niger, ſupra nigro-æneus, thorace lato.

Loc. Habitat arenam.

* 47. B. plateoſus.

Le Bupreſte à plaques.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

B. capite cœruleo-nitido, thorace fulvo; elytris luteis ſtriatis maculis ſex atris.

Loc.

48. B. luctuoſus.

Le Bupreſte en deuil.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

B. totus niger, thorace lato lævi, elytrorum ſtriis lævibus.

Loc. Habitat humum ſub lapidibus.

* 49. B. fumoſus.

Le Bupreſte noir à pattes brunes.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

B. totus niger, elytris ſtriatis, pedibus fuſcis.

Loc.

50. B. ſericeus.

Le Bupreſte noir velouté.

Long. 6 lig. Larg. 2 lig.

B. ater ſubvilloſus, antennis pedibuſque ferrugineis.

Loc. Habitat agros.

51. B. æruginoſus.

Le Bupreſte cuivreux à pattes brunes.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

B. totus nigro-auratus, elytris ſtriatis, pedibus fuſcis.

Loc.

52. B. leporinus.

Le Bupreſte noir à pattes brunes.

B. ater, lævis, pedibus antennarumque baſi ferrugineis.

Loc.

* 53. B. connexus.

Le Bupreſte à ſuture.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

B. niger, pedibus fulvis : elytris fulvis ſuturâ margineque poſtico nigris.

Loc.

54. B. pſittaceus.

Le Bupreſte perroquet.

Long. 5, 3 lig. Larg. 2, 1 lig.

B. totus viridi cupreus, antennis nigris.

Loc. Habitat agros & hortos, frequentiſſimus.

55. B. variegatus.

Le Bupreſte vert à bordure.

Long. 4 ½ lig. Larg. 2 lig.

B. viridis, pedibus elytrorumque margine exteriore pallide teſtaceis.

Loc. Habitat agros.

56. B. melanocephalus.

Le Bupreſte noir à corcelet rouge.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

B. niger, thorace, antennis pedibuſque ferrugineis.

Loc. Habitat agros.

57. B. rubeſcens.

Le Bupreſte fauve.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

B. ferrugineo-lividus, elytris punctato-ſtriatis.

Loc.

* 58. B. roſaceus.

Le Bupreſte rouget.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

B. niger lævis, thorace antennis pedibuſque rubris.

Loc.

* 59. B. ruſticus.

Le Bupreſte brunet.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

B. niger punctatus, thorace capite antennis pedibuſque fuſcis.

Loc.

*60. B. humeralis.

Le Bupreſte à nœud d'épaule.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

B. niger ſtriatus, pedibus pallidis, elytrorum baſi maculâ flavâ.

Loc.

XIV. BRUCHUS. *LA BRUCHE.*

Antennæ filiformes.
Thorax ſubrotundus gibbus.
Corpus ſphæroidæum, dorſo convexo.

1. B. fur.

La Bruche à bandes.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

B. teſtaceus, elytrorum faſciâ duplici albidâ.

Loc. Habitat herbaria, plantas ſiccas devorat.

2. B. apterus.

La Bruche ſans aîles.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

B. totus teſtaceus, elytris coadunatis.

Loc. Habitat plantas ſiccas.

* 3. B. cruciatus.

La Bruche à croix de S. André.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

B. fuſcus ſubvilloſus, ſcutello albo, elytris cruce divaricatâ albidâ.

Loc.

XV. LAMPYRIS. *Le Ver-luisant.*

Antennæ filiformes.

Caput clypeo thoracis marginato tectum.

Abdominis latera plicato-papilloſa.

1. L. nocticula.

Le Ver-luiſant à femelle ſans aîles.

Le mâle. Long. 3 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

La femelle. Long. 6 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

L. fæminâ apterâ.

Loc. Fæmina abdomine nudo campos habitat, mas in hortis volitat per noctem.

2. L. hemiptera.

Le Ver-luiſant à demi-fourreaux.

Long. 2 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

L. hemiptera.

Loc. Idem.

3. L. ſanguinea.

Le Ver-luiſant rouge.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

L. elytris rubris, thorace rubro, nigrâ maculâ.

Loc. Idem.

XVI. CICINDELA. *LA CICINDELE.*

Antennæ fili formes.
Thorax planus, marginatus.
Caput detectum.
Elytra flexilia.

1. C. fuſca.

La Cicindele noire à corcelet maculé.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

C. elytris nigricantibus thorace rubro, nigrâ maculâ.

Loc. Habitat flores.

2. C. livida.

La Cicindele à corcelet rouge.

Long. 5, 6 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. thorace rubro immaculato, genubus poſticis nigris.

Varietas A. elytris teſtaceis, thorace rubro immaculato, genubus poſticis nigris.

B. elytris nigricantibus, thorace rubro immaculato, genubus poſticis nigris.

Loc. Habitat flores.

3. C. nigra.

La petite Cicindele noire.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. elytris nigricantibus, thorace rubro immaculato, genubus omnibus rubris.

Loc. Idem.

4. C. pallida.

La petite Cicindele pâle.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

C. elytris teſtaceis, thorace rubro immaculato, genubus omnibus rubris.

Loc. Idem.

5. C. maculata.

La Cicindele à étuis tachés de noir.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

C. rubra, elytris teſtaceis, apice nigris.
Loc. Habitat flores.

6. C. luteſcens.
La Cicindele noire à étuis jaunes.
Long. 2, 2 ½ lig. Larg. ⅔ lig.
C. nigra, elytris pedibuſque pallidis.

Varietas A. nigra, thorace omnino nigro, elytris pedibuſque pallidis.
B. nigra, thoracis margine flavo, elytris pedibuſque pallidis.

Loc. Idem.

7. C. ænea.
La Cicindele bedeau.
Long. 3 lig. Larg. 1 ½ lig.
C. viridi-ænea, elytris extrorſum rubris.
Loc. Idem.

8. C. bipuſtulata.
La Cicindele verte à points rouges.
Long. 3 lig. Larg. 1 ½ lig.
C. æneo-viridis, elytris apice rubris.
Loc. Habitat flores.

9. C. elegans.

La Cicindele verte à points jaunes.

C. æneo-viridis, elytris apice flavis.

Varietas A. tota æneo-viridis, elytris apice flavis.
B. cœruleo-viridis, thoracis margine rubro, elytris apice flavis.

Loc. Habitat flores.

10. C. minima.

La Cicindele noire à points jaunes & corcelet rouge.

Long. 1 ½ lig. Larg. ½ lig.

C. fuſca, elytris apice flavis, thorace rubro nigrâ maculâ.

Loc. Idem.

11. C. biguttata.

La Cicindele noire à points jaunes & corcelet noir.

C. fuſca, elytris apice flavis, thorace fuſco.

Loc. Idem.

12. C. faſciata.
La Cicindele à bandes rouges.

C. elytris nigris, faſciis duabus rubris.
Loc. Habitat flores.

13. C. thoracica.
La Cicindele verte à corcelet rouge.
Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.
C. viridis, thorace rubro immaculato.
Loc. Idem.

14. C. viridi-cœrulea.
La Cicindele verdâtre.
Long. 3 lig. Larg. 1 lig.
C. viridi-cœrulea.

Varietas A. viridis.
B. cœrulea.
C. viridi-cœrulea.
Loc. Idem.

15. C. plumbea.
La Cicindele plombée.
Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.
C. plumbeo-nigra.
Loc. Idem.

16. C. cinerea.

La Cicindele cendrée.

Long. 2 lig. Larg. ½ lig.

C. villoſo-cinerea.

Loc. Habitat flores.

17. C. rotundata.

La Cicindele bronzée.

Long. 1 lig.

C. plumbeo-cuprea, tibiis pallidis, abdomine ſubrotundo.

Loc. Idem.

XVII. OMALISUS. *L'Omalise.*

Antennæ filiformes.
Thorax planus tetragonus, angulis poſterioribus in ſpinam productis.

1. O. fontis bellaquæi.

L'Omaliſe.

Long. 2 ¼ lig. Larg. 1 lig.

Loc. Habitat fontem bellaquæum.

XVIII. HYDROPHILUS. *L'Hydrophile.*

Antennæ clavatæ perfoliatæ antennulis breviores.
Pedes natatorii.

1. H. picæus.
Le grand Hydrophile.
Long. 17 lig. Larg. 9 lig.
H. niger, elytris ſulcatis, antennis fuſcis.
Loc. Habitat rivulos & ſtagna.

2. H. caraboides.
L'Hydrophile noir picoté.
Long. 7 lig. Larg. 3 lig.
H. niger, elytrorum punctis per ſtrias digeſtis, antennis nigris.
Loc. Habitat aquas.

3. H. punctatus.
L'Hydrophile liſſe à points.
Long. 2 lig. Larg. 1 lig.
H. niger, elytris lævibus denſe punctatis.
Loc. Idem.

Digitized by Google

4. H. fuſcipes.

L'Hydrophile noir ſtrié.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

H. niger, elytris ſtriatis, pedibus fuſcis.

Loc. Habitat aquas.

5. H. fulvus.

L'Hydrophile fauve.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

H. fulvus.

Loc. Idem.

XIX. DYTICUS. *Le Ditique.*

Antennæ filiformes, capite longiores. Pedes natatorii.

1. D. ſtagnalis.

Le Ditique brun à bordure.

Long. 8 lig. Larg. 4 lig.

D. fuſcus, margine coleoptrorum thoraciſque flavo.

Loc. Habitat ſtagnantes aquas.

2. D. marginalis.

Le Ditique noir à bordure.

Long. 1 pouce. Larg. 6 lig.

D. niger, margine coleoptrorum thoraciſque flavo.

Loc. Habitat ſtagna.

3. D. ſemiſtriatus.

Le Ditique demi-ſilloné.

Long. 14 lig. Larg. 7 lig.

D. elytris ſtriis viginti dimidiatis.

Loc. Habitat aquas.

4. D. cinereus.

Le Ditique à corcelet à bandes.

Long. 7 lig. Larg. 4 lig.

D. cinereus, margine coleoptrorum flavo, thoracis medietate flavâ.

Loc. Habitat ſtagna.

5. D. ſulcatus.

Le Ditique ſillonné.

Long. 6 lig. Larg. 4 lig.

D. elytris ſulcis decem longitudinalibus, thoracis medietate flavâ.

Loc. Idem.

6. D. luctuoſus.

Le Ditique en deuil.

Long. 4 lig. Larg. 2 lig.

D. totus niger lævis.

Loc. Idem.

7. D. teſſelatus.

Le Ditique fauve à taches noires.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

D. fulvus, maculis ſparſis nigris.

Loc. Habitat aquam.

8. D. variegatus.

Le Ditique à bordure panachée.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

D. fuſcus, elytris antice & externe flavis.

Loc. Idem.

9. D. lividus.

Le Ditique noir à étuis bruns.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

D. ater, elytris fuſcis.

Loc. Idem.

10. D. ovatus.

Le Ditique ſphérique.

Long. 2 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

D. ovatus fuſcus, capite thoraceque rubicundis.

Loc. Idem.

11. D. melanophtalmos.

Le Ditique aux yeux noirs.

Long. 1 $\frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

D. flavo-fuſcus, oculis nigris, elytris lævibus.

Lo. Habitat aquas ſtagnantes.

12. D. thoracicus.

Le Ditique ſtrié à corcelet jaune.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

D. cinereus, capite nigro, thorace luteo, elytris nigro-maculatis punctato-ſtriatis.

Loc. Habitat ſtagna.

13. D. quadratus.

Le Ditique panaché ſans ſtries.

Long. 2 lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

D. niger, thorace flavo, elytris lævibus, maculis limboque luteis.

Loc. Idem.

14. D. monoſtriatus.

Le Ditique à une ſeule ſtrie.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

D. niger, elytris maculis & limbo luteis, ſtriâ unicâ.

Loc. Idem.

Digitized by Google

15. D. clavi-cornis.

Le Ditique à groſſes antennes.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

D. fuſcus, capite thoraceque fulvo, antennis ſubclavatis, ſcutello nullo.

Loc. Habitat aquas ſtagnantes.

* 16. D. hebraicus.

Le Ditique hébraique.

Long. 3 ½ lig. Larg. 2 lig.

D. niger, capite thoraceque antice flavis, elytris lævibus, maculis aliquot luteis, nonnullis connexis.

Loc. Habitat ſtagna.

* 17. D. punctatus.

Le Ditique picoté.

Long. 5 lig. Larg. 2 ½ lig.

D. thorace flavo maculâ nigrâ, elytris fuſcis punctis nigris confertis.

Loc. Habitat aquas.

* 18. D. marmoratus.

Le Ditique marbré.

Long. 2 lig. Larg, 1 lig.

D. fuſco-pallidus, elytris externe maculis obliquis lineiſque albidis.

Loc. Habitat rivulos & ſtagna.

XX. GYRINUS. *Le Tourniquet.*

Antennæ rigidæ, capite breviores.
Pedes natatorii.
Oculi quatuor.

1. G. natator.

Le Tourniquet.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

Loc. Habitat aquarum ſuperficiem quam per orbes concentricos vivaciſſime peragrat.

ORDO SECUNDUS.

Caract. Ordinis II.

Tarſorum articuli quatuor.

XXI. MELOLONTHA. *La Melolonte.*

Antennæ ſerratæ ante oculos poſitæ.

1. M. quadri-punctata.

La Melolonte quadrille à corcelet noir.

Long. 4 lig. Larg. 2 lig.

M. coleoptris rubris, maculis quatuor nigris, thorace nigro.

Loc. Habitat pruni ſylveſtris folia.

2. M. rubra.

La Melolonte quadrille à corcelet rouge.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

M. coleoptris rubris, maculis quatuor nigris, thorace rubro nigrâ maculâ.

Loc. Habitat prunum ſylveſtrem.

3. M. pallida.

La Melolonte liſette.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

M. nigro-viridis, elytris luteo-pallidis.

Loc. Habitat ſylvas.

4. M. cœrulea.

La Melolonte bleuette.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Lerg. $\frac{3}{4}$ lig.

M. cœrulea, thorace pedibuſque ferrugineis.

Loc. Idem.

5. M. muſcoides.

La Melolonte mouche.

Long. 1 $\frac{3}{4}$ lig. Larg. 1 lig.

M.

M. viridi-cœruleo, thorace rubro cœruleâ maculâ, tibiis ferrugineis.

Loc. Habitat ſylvas.

6. M. cuprea.

La Melolonte cuivreuſe.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

M. oblonga nigro-cuprea, ſubvilloſa elytris punctatis.

Loc. Idem.

XXII. PRIONUS. *LE PRIONE.*

Antennæ ſerratæ in oculo poſitæ.

1. P. coriarius.

Le Prione.

Long. 15 lig. Larg. 9 lig.

Loc. Habitat ſylvas, larva arborum truncos.

XXIII. CERAMBYX. *LE CAPRICORNE.*

Antennæ à baſi ad apicem decreſcentes, in oculo poſitæ.

Thorax aculeatus.

1. C. cerdo.

Le grand Capricorne noir.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ pouce. Larg. 6 lig.

C. fuſco-niger, elytris rugoſis, apice

interiore ſpinoſis, antennis corpore longioribus.

Loc. Larva truncos arborum habitat; cerambix ſylvas.

2. C. piceus.

Le petit Capricorne noir.

Long. 9 lig. Larg. 3 ½ lig.

C. ater, elytris rugoſis integris, antennis corpore longioribus.

Loc. Idem.

3. C. textor.

Le Capricorne noir chagriné.

Long. 1 pouce. Larg. 5 lig.

C. ater, elytris punctis elevatis, antennis corpore brevioribus.

Loc. Idem.

4. C. alpinus.

La Roſalie.

Long. 15 lig. Larg. 4 lig.

C. cinereo-cœruleſcens, elytrorum maculis ſex fuſcis.

Loc. Habitat exeſos arborum truncos.

5. C. moſchatus.

Le Capricorne vert à odeur de roſe.

Long. 1 pouce. Larg. 3 ½ lig.

C. viridi-cœruleſcens.

Loc. Habitat truncos & folia ſalicis.

6. C. ruber.

Le Capricorne rouge.

Long. 8 lig. Larg. 2 $\frac{2}{3}$ lig.

C. niger, elytris thoraciſque lateribus rubris.

Loc. Habitat truncos arborum.

7. C. monilis.

Le Capricorne noir marbré de gris.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. niger, elytris vellere cinereo marmoratis, antennis pedibuſque cinereo interſectis.

Loc. Habitat ſalices.

8. C. faſciatus.

Le Capricorne ovale cendré.

Long. 6 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

C. ater ovatus, antennis corpore dimidio brevioribus, elytris vellere cinereo albidis.

Varietas A. elytris fuſcis vellere cinereo faſciatis.

Loc. Habitat ſepium arbuſta.

9. C. hiſpidus.

Le Capricorne à étuis dentelés.

Long. 3 lig. Larg. 1, 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. ovatus, fuſcus, elytris antice cinereis, apice bidentatis.

Loc. Habitat pratorum gramina.

10. C. ovatus.

Le Capricorne brun de forme ovale.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

C. ovatus fuſcus, elytris integris.

Loc. Idem.

11. C. compreſſus.

Le Capricorne applati.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. niger, compreſſus, ſcaber, thorace utrinque ſerrato, pedibus fulvis.

Loc.

* 12. C. dentatus.

Le Capricorne à pointes.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

C. fuſco-nebuloſus, elytris antice cinereis, apice unidentatis.

Loc.

13. C. nebuloſus.

Le Capricorne nébuleux.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. fuſco-nebuloſus, elytris antice thoracique medio ſubcinereis, elytris integris.

Loc.

XXIV. LEPTURA. *LA LEPTURE.*

Antennæ à baſi ad apicem decreſcentes, in oculo poſitæ.

Thorax inermis.

FAMIL. I. *Thorace cylindraceo.*

1. L. carcharias.

La Lepture chagrinée.

Long. 1 pouce. Larg. 4 lig.

L. cinerea, nigro-punctata, thorace cylindraceo.

Loc. Habitat truncos arborum.

2. L. ſubcœrulea.

La Lepture ardoiſée.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

L. tota cœruleo-atra, capite thoraceque ſubvilloſo.

Loc. Habitat flores.

3. L. betulina.

La Lepture à corcelet cylindrique & taches jaunes.

Long. 4, 5, 6 lig. Larg. 1, 1 ½ lig.

L. nigra, thoracis lineis tribus, elytrorumque maculis villoſo-flavis, thorace cylindraceo, antennis corpus æquantibus.

Loc. Habitat betulam.

4. L. piloſa.

La Lepture noire à étuis jaunes.

Long. 2 lig. Larg. ½ lig.

L. nigra; elytris flavis, apice nigris.

Loc. Habitat hortos.

5. L. oculata.

La Lepture aux yeux de Paon.

Long. 5 lig. Larg. 2 ½ lig.

L. nigro-cinerea, thorace elytriſque maculis oculiferis atris, circulo cinereo, thorace ſubcylindraceo.

Loc. Habitat hortos, rara, in horto regio inventa.

* 6. L. nebuloſa.

La Lepture nébuleuſe.

Long. 6 lig, Larg. 2 ½ lig.

L. fuſca, ſubvilloſa, maculis cinereis marmorata.

Loc.

7. L. ferruginea.

La Lepture rouillée.

Long. 17 lig. Larg. 5 lig.

L. tota nigro-ferruginea, thorace ſubcylindraceo.

Loc. Habitat ſylvas.

* 8. L. fulvipes.

La Lepture à pattes fauves.

Long. 6 lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

L. atra, punctata, pedibus flavis, thorace cylindraceo.

Loc. Habitat agros fontis-Bellaquæi.

FAMIL. II. *Thorace globoſo.*

9. L. variegata.

La Lepture à corcelet rond & taches jaunes.

Long. 6 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

L. nigra, maculis villoſo-flavis, thorace globoſo, antennis corporis dimidio brevioribus.

Loc. Habitat hortos.

10. L. villoſa.

La Lepture velours jaune.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

L. nigra, villoſo-flava, maculis duabus in elytro ſingulo glabris nigris.

Loc. Habitat flores.

11. L. punctata.

La Lepture à corcelet rouge ponctué.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

L. nigricans, capite thoraceque rubro; punctis nigris.

Loc. Habitat hortos.

12. L. arcuata.

La Lepture aux croiſſans dorés.

Long. 5, 6, 8 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$, 2 lig.

L. nigra, elytrorum lineis quatuor arcuatis, punctiſque flavis, pedibus teſtaceis.

Loc. Habitat arborum truncos.

13. L. arietis.

La Lepture à trois bandes dorées.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

L. nigra, elytrorum lineis tribus tranſver

ſis punctiſque flavis, pedibus teſtaceis.

Loc. Habitat flores.

14. L. ruſtica.

La Lepture à raies blanches.

Long. 2 ½, 4 lig. Larg. 1, 1 ½ lig.

C. nigra, elytrorum lineis tranſverſis punctiſque albis.

Loc. Habitat umbelliferarum flores.

15. L. ſignata.

La Lepture noire à étuis gris tachés de jaune.

Long. 4 ½ lig. Larg. 1 ⅔ lig.

L. nigra, elytris pallido-fuſcis, ſignaturis flavis.

Loc. Habitat flores.

16. L. gammoides.

La Lepture jaune à bandes noires.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

L. villoſo-flava, elytris lineis tribus tranſverſis nigris.

Loc. Idem.

17. L. myſtica.

La Lepture arlequine.

Long. 5 lig. Larg. 1 ½ lig.

L. nigra, elytris maculis teſtaceis, nigris, albidis, lineiſque nigris & albicantibus variegatis.

Loc. Rar. hab. hortos, in regio horto inventa.

18. L. cyanea.

La Lepture bleue.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

L. cœrulea, tribus rufis thorace ſubgloboſo.

Loc. Habitat arborum truncos.

FAMIL. III. *Thorace inæquali ſcabro.*

19. L. quadri-punctata.

La Lepture brune à corcelet rhomboïdal.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

L. teſtaceo-fuſca, thorace rhomboidali villoſo, elytrorum maculis quatuor albidis tranſverſim poſitis.

Loc. Habitat arbores.

* 20. L. vidua.

La Lepture veuve.

Long. 7 lig. Larg. 2 lig.

L. tota atra, denſe punctata.

Loc. Habitat arbores.

21. L. teſtacea.

La Lepture livide à corcelet liſſe.

Long. 4 $\frac{3}{4}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

L. teſtacea, thorace glabro.

Loc. Habitat flores.

* 22. L. punctuoſa.

La Lepture maroquinée.

Long. 6 lig. Larg. 1 $\frac{3}{2}$ lig.

L. atra, denſe punctata, femoribus rufis.

Loc.

23. L. femorata.

La Lepture noire à corcelet rougeâtre.

L. atra, thorace teſtaceo, femoribus craſſis.

Loc. Habitat flores.

* 24. L. turcica.

La Lepture aux croiſſans d'argent.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

L. nigra, elytris antice rufis, poſtice lineis quatuor albis arcuatis.

Loc. Habitat hortos.

25. L. craſſipes.

La Lepture noire à groſſes cuiſſes brunes.

L. atra, femoribus craſſis rufis.
Loc. Habitat flores.

26. L. fuſca.

La Lepture brune.

Long. 2 ½ lig. Larg. 1 ⅔ lig.
L. tota fuſca punctata.
Loc. Idem.

27. L. ſanguinea.

La Lepture veloutée couleur de feu.

Long. 5 lig. Larg. 1 ¾ lig.
L. nigra, thorace coleoptriſque ſericeo-rubris.
Loc. Habitat truncos arborum & frequentiſſimè loca domorum ubi lignum ſervatur.

28. L. attenuata.

La Lepture à étuis étranglés.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

L. nigra, elytris pedibuſque rubeſcentibus lividis, coleoptris attenuatis.

Loc. Habitat flores.

XXV. STENOCORUS. *Le Stencore.*

Antennæ à baſi ad apicem decreſcentes, ante oculos poſitæ.

Elytra apice anguſtiora.

Famil. I. *Thorax armatus ſpinâ vel tuberculo laterali.*

1. S. pariſinus.

Le Stencore liſſe à bandes jaunes.

Long. 8, 9 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

S. glaber, è fuſco niger, elytro ſingulo lineis tribus elevatis, maculis duabus luteis, thorace ſpinoſo.

Loc. Habitat ſylvas.

2. S. inquiſitor.

Le Stencore noir velouté de jaune.

Long. 6 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

S. niger, vellere flavo variegatus, ely-

tris lineis duabus elevatis, thorace ſpinoſo.

Loc. Habitat flores.

3. S. geniculatus.

Le Stencore à genoux noirs.

Long. 7, 8, 10 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$, 2, 2 $\frac{1}{3}$ lig.

S. è fuſco niger, femoribus rufis articulis nigris.

Loc. Idem.

4. S. rubro-violaceus.

Le Stencore rouge à étuis violets.

Long. 9 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

S. ruber, oculis nigris, elytris violaceis.

Loc. Habitat arbores.

5. S. rubeus.

Le Stencore jaune à bandes noires.

Long. 6 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

S. niger, elytris teſtaceo-flavis, punctis duobus, cruce faſciiſque nigris.

Loc. Habitat rubum.

FAMILIA II. *Thorax inermis.*

6. S. lamed.

Le Stencore bedeau.

S. niger, elytris rubeſcentibus, apice ſuturæque medietate nigris.

Loc.

7. S. melanurus.

Le Stencore noir à étuis rougeâtres.

S. niger, elytris rubeſcentibus lividis, apice nigris. *Mas.*

S. niger, elytris rubeſcentibus lividis, apice ſimili. *Fœmina.*

Loc. Habitat ſepes & arbores.

8. S. luteſcens.

Le Stencore noir à étuis jaunes.

S. niger, elytris luteis, apice nigris.

Loc. Habitat rubum.

9. S. piceus.

Le Stencore noir à ventre rougeâtre.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

S. niger nitidus, abdomine fuſco-rubente.

Loc. Idem.

10. S. clavipes.

Le Stencore noir à cuiſſes rouges.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

S. niger, femoribus clavatis rufis, apice nigris.

Varietas A. S. totus niger.

Long. 3 $\frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

Loc.

11. S. ſylveſtris.

Le Stencore noir à corcelet rouge.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

S. niger, thorace rubro.

Loc. Habitat urbem *Fontainebleau.*

12. S. aquaticus.

Le Stencore doré.

Long. 2 $\frac{1}{2}$, 3, 4 lig. Larg. $\frac{2}{3}$, 1 lig.

S. deauratus, femoribus poſticis dentatis.

Varietas A. Stenocorus rubro-æneus, femoribus poſticis dentatis.

B. Stenocorus viridi-æneus, femoribus poſticis dentatis.

C. Stenocorus flavo-æneus, femoribus poſticis dentatis.

D. Stenocorus violaceo-æneus, femoribus poſticis dentatis.

E. Stenocorus nigro-æneus, femoribus poſticis dentatis.

Loc. Habitat rivulorum ripas, & irides pratorum.

* 13. S. ruber.

Le Stencore rouge.

Long. 6 lig. Larg. 2 lig.

S. totus ruber, oculis nigris.

Loc.

* 14. S. ignitus.

Le Stencore noir à étuis rouges.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

S. niger, elytris, ruberrimis denſe punctatis.

Loc.

* 15. S. funereus.

Le Stencore en deuil.

Long. 9 lig. Larg. 3 lig.

S. totus niger punctatus.

Loc.

XXVI. LUPERUS. *Le Lupere.*

Antennæ filiformes articulis longis.
Thorax planus, marginatus.

1. L. ulmarius.

Le Lupere noir à corcelet & pattes rouges.

Digitized by Google

L. niger, thorace pedibuſque rufis.
Loc. Habitat ulmum.

2. L. betulinus.

Le Lupere noir à pattes rouges.

Long 1 ½ lig. Larg. ¾ lig.

L. niger, pedibus rufis.
Loc. Habitat betulam.

XXVII. CRYPTOCEPHALUS. *Le Gribouri.*

Antennæ filiformes articulis longis.
Thorax gibbus hemiſphæricus.

1. C. alni.

Le Gribouri bleu de l'aulne.

Long. 4 lig. Larg. 3 lig.

C. violaceus, punctis inordinatis.
Loc. Habitat alnum.

2. C. vitis.

Le Gribouri de la vigne.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. niger, elytris rubris.
Loc. Habitat vitis folia.

3. C. ſericeus.

Le Velours vert.

Long. 3, 4 lig. Larg. 2 lig.

C. viridi-auratus ſericeus.

Loc. Habitat ſalicem.

4. C. bolati.

Le Gribouri à deux bandes jaunes.

Long. 1 $\frac{1}{2}$, 2 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

C. niger, elytro ſingulo duplici linea longitudinali flava.

Loc. Habitat prata & ſepes.

5. C. 4-maculatus.

Le Gribouri à deux taches jaunes.

C. niger, capite thoraceque antice luteis, elytro ſingulo externe maculâ duplici flavâ.

Loc. Idem.

6. C. bi-punctatus.

Le Gribouri rouge ſtrié à points noirs.

Long. 2 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. niger, elytris rubris ſtriatis, maculis quatuor limboque nigris.

Loc. Habitat cirſium.

7. C. cirſii.

Le Gribouri rouge ſans ſtries, à points noirs.

C. niger, thorace lineis flavis, elytris rubris punctatis, maculis quatuor limboque nigris.

Loc. Idem.

8. violaceus.

Le Gribouri bleu ſtrié.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. cœruleo-violaceus, punctis per ſtrias digeſtis.

Loc.

9. S. cœruleus.

Le Gribouri bleu à points.

Long. 2 lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

C. cœruleus, punctis ſparſis, tibiis anticis ferrugineis.

Loc.

10. C. niger.

Le Gribouri noir ſtrié.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

C. niger ſtriatus, pedibus rufis.

Loc.

11. C. rufipes.

Le Gribouri noir à corcelet rouge.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

C. niger ſtriatus, thorace pedibuſque rufis.

Loc.

12. C. fulvus.

Le Gribouri fauve.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. capite thoraceque fulvo, elytris pallidis.

Loc.

* 13. C. 10-maculatus.

Le Gribouri rouge à 10 taches noires.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

C. niger, elytris rubris punctatis maculis decem nigris.

Loc.

* 14. C. limboſus.

Le Gribouri rouge à corcelet jaune.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. thorace flavo maculis nigris; elytris rubris punctatis, maculis ſex limboque nigris.

Loc

* 15. C. chermeſinus.

Le Gribouri couleur de feu.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. niger thorace elytriſque rubris punctatis.

Loc.

* 16. C. fuſcipes.

Le Gribouri à pattes brunes.

Long. 2 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. cœruleus, punctis inordinatis, pedibuſque villoſo-fuſcis.

Loc.

XXVIII. CRIOCERIS. *Le Criocere.*

Antennæ cylindraceæ articulis globoſis. Thorax cylindraceus.

1. C. merdigera.

Le Criocere rouge du lys.

Long. 3 lig. Larg. 1 ½ lig.

C. rubra.

Loc. Habitat lilia.

2. C. 12-punctata.

Le Criocere rouge à points noirs.

Long. 2 ½ lig. Larg. 1 ⅓ lig.

C. rubra, punctis tredecim nigris.

Loc. Habitat aſparagum.

3. C. aſparagi.

Le Criocere porte-croix de l'aſperge.

Long. 2 ⅔ lig. Larg. 1 lig.

C. thorace rubro punctis duobus nigris, coleoptris flavis, cruce cœruleo-nigra.

Loc. Idem.

4. C. hordei.

Le Criocere bleu à corcelet rouge.

Long. 2 lig. Larg. ⅔ lig.

C. cœruleo-viridis thorace femoribuſque rufis.

Loc. Habitat hordeum & avenam.

5. C. cyanella.

Le Criocere tout bleu.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

C. tota cœruleo-viridis.

Loc.

6. C. pallida.

Le Criocere aux yeux noirs.

Long. 2 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. 1 lig.

C. pallida, oculis nigris.

Loc.

* 7. C. ſpinoſiſſima.

La Châtaigne noire.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. tota atra, ſpinis horrida.

Loc. Habitat gramen loliaceum.

* 8. C. thoracica.

Le Criocere noir à corcelet rouge.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

C. atro-cœrulea, thorace femoribuſque fuſcis, elytris punctis ſparſis.

Loc.

* 9. C. atrata.

Le Criocere noir ſtrié.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

C.

C. tota atro-cœrulea ſtriata.
Loc.

* 10. C. paleata.
Le Criocere paillet.
Long. 2 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. 1 lig.
C. nigra, elytris pedibuſque pallidis.
Loc.

XXIX. ALTICA. *L'ALTISE.*
Antennæ ubique æquales.
Femora poſtica craſſa ſubgloboſa.

1. A. helxines.
L'Altiſe bleue.
Long. 2 lig. Larg. 1 lig.
A. viridi-cœrulea.
Loc. Habitat hortos.

2. C. malvæ.
L'Altiſe de la mauve.
A. nigra, elytris cœruleis, thorace pedibuſque rubris.
Loc. Habitat folia malvæ.

3. A. bicolor.
L'Altiſe bedaude.
Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

A. nigra, elytris nigro-æneis ſtriatis, thorace rubro, pedibus nigris.

Loc. Habitat malvam.

4. A. hortenſis.

L'Altiſe noire dorée.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

A. nigra-ænea, elytris ſtriatis, pedibus ferrugineis.

Loc. Habitat hortos frequentiſſima.

5. A. ovata.

L'Altiſe noire ovale.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

A. nigro ænea, ovata, pedibus nigris.

Loc. Habitat hortos.

6. A. braſſicæ.

L'Altiſe noire allongée des cruciferes.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

A. nigro-ænea, oblonga, pedibus nigris.

Loc. Habitat cruciferas.

7. A. lævis.

L'Altiſe noire à pattes fauves.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{5}{6}$ lig.

A. nigra, ovata, pedibus rufis, elytris non ſtriatis.

Loc. Habitat hortos.

8. A. minuta.

L'Altiſe noire à jambes jaunes.

Long. $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

A. nigra, ſubrotunda, tibiis ferrugineis.

Loc. Idem.

9. A. nemorum.

L'Altiſe à bandes jaunes.

Long. $\frac{1}{2}$, 1 lig. Larg. $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ lig.

A. atra, elytris longitudinaliter in medio flaveſcentibus.

Loc. Habitat aromaticas plantas.

10. A. marginata.

L'Altiſe à bordure noire.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

A. nigra; thorace elytriſque flavis, oris nigris.

Loc. Habitat hortos.

11. A. hyoſciami.

L'Altiſe du choux.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

A. cœrulea, elytris ſtriatis, tibiis ferrugineis.

Loc. Habitat braſſicam & hyoſciamum.

12. A. cœrulea.

L'Altiſe bleue ſans ſtries.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{4}{5}$ lig.

A. cœrulea, elytris punctis ſparſis, tibiis ferrugineis.

Loc. Habitat braſſicam.

13. A. nitidula.

L'Altiſe rubis.

Larg. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

A. nigro-aurata, thorace aureo, femoribus ferrugineis.

Loc. Habitat ſalicem.

14. A. aurea.

Le Plutus.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

A. aurea, pedibus flavis.

Loc. Habitat hortos.

15. A. 4-punctata.

L'Altiſe à points rouges.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{4}{5}$ lig.

A. nigra, coleoptris punctis quatuor rubris.
Loc. Idem.

16. A. ferruginea.
L'Altiſe fauve à ſtries.

A. oblonga, ferruginea, elytris ſtriatis.
Loc. Idem.

17. A. fulva.
L'Altiſe fauve ſans ſtries.
Long. lig. Larg. lig.
A. ovata ferruginea, elytris punctis ſparſis.
Loc. Idem.

18. A. exſoleta.
L'Altiſe jaune.
Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.
A. flava.
Loc. Idem.

19. A. pallida.
La Paillette.
Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.
A. elytris pallido-flavis, capite nigro.
Loc. Idem.

* 20. A. ænea.

L'Altiſe bronz ée.

Long. 1 ½ lig. Larg. 1 lig.

A. nigro-ænea, ovata, pedibus rufis, elytris punctis ſparſis.

Loc. Habitat hortos.

XXX. GALERUCA. *La Galeruque.*

Antennæ ubique æquales, articulis ſubglobofis.

Thorax inæqualis, ſcaber, marginatus.

1. G. tanaceti.

La Galeruque brunette.

Long. 4 lig. Larg. 3 lig.

G. atro-fuſca, elytris lineis tribus elevatis, punctis numeroſis.

Varietas A. fuſca, elytris lineis elevatis interruptis.

Loc. Habitat tanacetum, & flores compoſitos in pratis.

2. G. ſanguinea.

La Galeruque ſanguine.

Long. 2 ½ lig. Larg. 1 ½ lig.

G. ſanguineo-rubra.

Loc. Habitat flores.

3. G. ulmi.

La Galeruque à bandes de l'orme.

Long. 2, 3 lig. Larg. 1 ½, 2 lig.

G. pallida, thorace nigro variegato, elytris faſciis duabus longitudinalibus nigris.

Loc. Habitat folia ulmi, abundans.

4. G. aquatica.

La Galeruque aquatique.

Long. 2 lig. Larg. 1 ½ lig.

G. pallida, thorace nigro variegato, elytris unicoloribus pallidis.

Loc. Habitat potamogeton in rivis & ſtagnis.

5. G. livida.

La Galeruque griſette.

Long. 2 ½ lig. Larg. 1 ½ lig.

G. nigra, thorace elytriſque luteo-lividis.

Loc. Habitat betulam.

6. G. violacea.

La Galeruque violette.

Long. 3 lig. Larg. 1 ½ lig.

G. nigro-violacea.

Loc.

* 7. G. viridis.

La Galeruque verte.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

G. thorace pallide flaveſcente, elytris viridibus nitentibus.

Loc.

8. G. 4-maculata.

La Galeruque quadrille.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. 1 lig.

G. rubro-lutea, maculis quatuor nigris.

Loc.

XXXI. CHRYSOMELA. *LA CHRYSOMELE.*

Antennæ à baſi ad apicem creſcentes, articulis globoſis.

Thorax æqualis marginatus.

1. C. populi.

La grande Chryſomele rouge à corcelet bleu.

Long. 5, 6 lig. Larg. 4 lig.

C. nigro-cœrulea, elytris rubris apice nigris.

Variet. A. ead. elytris omnino rubris.

La petite Cryſomele rouge à corcelet bleu.

Long. 3 lig. Larg. 2 lig.

Loc. Habitat populum.

2. C. polita.

La Chryſomele rouge à corcelet doré.

Long. 3 ½ lig. Larg. 2 ⅓ lig.

C. viridi-ænea, elytris rubicundis, punctis ſparſis.

Loc.

3. C. ſtriata.

La Chryſomele rouge à corcelet noir.

Long. 2 ½ lig. Larg. 1 ¾ lig.

C. nigra, elytris rubris ſtriatis, ſtriis punctatis.

Loc.

4. C. 10-punctata.

La Chryſomele rouge à points noirs.

Long. 3 lig. Larg. 2 lig.

C. rubra, elytro ſingulo maculis quinque nigris.

Loc. Habitat ſalicem.

5. C. hæmoptera.

La Chryſomele violette.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 3 lig.

C. tota violacea.

Loc.

6. C. violaceo-cœrulea.

La Chryſomele bleue à corcelet violet.

Long. 4 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

C. cœrulea, thorace violaceo.

Variet. ead. thorace nigro-violaceo.

Loc.

7. C. nigra.

La Chryſomele noire à aîles rouges.

Long. 3 lig. Larg. 2 lig.

C. tota nigra.

Loc.

8. C. ſanguinolenta.

La Chryſomele noire à bordure rouge.

Long. 5 lig. Larg. 4 lig.

C. nigro-cœrulea, elytris atris punctatis, margine exteriore rubro.

Loc. Habitat ſylvas.

9. C. marginata.

La Chryſomele bleue à bordure rouge.

Long. 3 ½ lig. Larg. 3 lig.

C. nigro-cœrulea, elytris lucidis, punctatis margine exteriore & anteriore rubris.

Loc. Habitat prata; rara.

10. C. graminis.

Le grand Vertubleu.

Long. 4 lig. Larg. 3 lig.

C. viridi-cœrulea.

Loc. Habitat galeopſim, lamium, mentham & gramina.

11. D. viridula.

La Chryſomele dorée.

Long. 2, 3 lig. Larg. 1 ½, 2 lig.

C. viridis nitida, thorace antice æquali, elytris pone contiguis.

Loc. Habitat flores labiatos.

12. C. ænea.

Le petit Vertubleu.

Long. 2 ½ lig. Larg. 1 ½ lig.

C. viridis nitida, thorace antice excavato, faſciis elytrorum longitudinalibus cœruleis.

Loc. Habitat flores labiatos.

13. C. nitidula.

La Chryſomele à gallons.

Long. 4 lig. Larg. 3 lig.

C. viridis nitida, ſtriis decem cupreis, punctorum duplici ſerie diviſis.

Loc. Idem.

14. B. faſciata.

L'Arlequin doré.

Long. 3, 3 ½ lig. Larg. 2, 2 ¼ lig.

C. aurea, faſciis cœruleis, cupreiſque alternis, punctis inordinatis.

Loc. Habitat colles aridos.

15. C. rubro-cuprea.

La Chryſomele briquetée.

Long. 4 ½ lig. Larg. 3 lig.

C. ſupra rubro-cupræa, infra nigra nitens.

Loc.

16. C. malvæ.

La Chryſomele verte à corcelet rouge.

Long. 1 $\frac{1}{4}$, 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. nigra, elytris cœruleo-viridibus, thorace pedibus antennarumque baſi rufis.

Loc. Habitat malvam.

17. C. betulæ.

La Chryſomele bleue du ſaule.

Long. 1 $\frac{1}{2}$, 2 lig. Larg. 1, 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. nigro-purpurea, punctis excavatis, ſtriata.

Loc. Habitat ſalicem & betulam.

18. C. thoracica.

La Chryſomele à ſuture noire.

Long. 1 $\frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{4}{5}$ lig.

C. rubra, thorace punctis duobus nigris, coleoptrorum ſuturâ nigrâ.

Loc.

19. C. caraboïdes.

La Chryſomele à un ſeul étui.

Long. 3, 6, 7 lig.

C. atro-purpurea, elytris coadunatis, alis nullis.

Loc. Habitat hortos & ſylvas; larva Gallium.

20. C. phellandrii.

La Chryſomele à bandes jaunes.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{4}{5}$ lig.

C. oblonga nigra, elytrorum lineis duabus longitudinalibus luteis.

Loc. Habitat phellandrium.

21. C. ferruginea.

La Chryſomele brunie.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. nigro cuprea, punctis elytrorum per ſtrias digeſtis.

Loc.

22. C. gemellata.

La Chryſomele à ſtries jumelles.

Long. 2 $\frac{1}{5}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. viridis, punctis elytrorum per ſtrias gemellas digeſtis.

Loc.

*23. C. ſcabra.

La Chryſomele greſillée.

Long. 1 $\frac{1}{?}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. viridi-aurea, elytris ſcabris nitentibus.

Loc.

24. C. antiqua.

La Chryſomele antique.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

C. tota fulvo-cuprea punctata.

Loc.

25. C. ſuturata.

La Chryſomele couturée.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. 1 lig.

C. rubeſcens, elytrorum ſtriis punctatis, ſutura nigra.

Loc.

26. C. tulipa.

La Chryſomele tulipe.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. thorace pedibuſque fulvis; elytris antice luteis maculâ fuſcâ; poſtice fuſcis, maculis luteis.

Loc.

XXXII. MYLABRIS. *Le Mylabre.*

Antennæ ſenſim creſcentes, articulis hemi.phæricis, roſtro brevi plano inſidentes.

Antennæ quatuor in extremo roſtri.

1. M. crucigera.

Le Mylabre à croix blanche.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

M. fuſca, cinereo-nebuloſa abdominis apice cruce albâ.

Loc. Larva legumina habitat, mylabris flores.

2. M. fuſca.

Le Mylabre brun.

Long. 3 lig. Larg. 1 ½ lig.

M. tota fuſca.

Loc.

3. M. ſericea.

Le Mylabre ſatiné.

Long. 1 lig. Larg. ½ lig.

M. nigra, abdomine albo ſericeo.

Loc. Habitat flores.

XXXIII. RHINOMACER. *Le Becmare.*

Antennæ clavatæ integræ, roſtro longo inſidentes.

1. R. elongatus.

Le Becmare levrette.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

R. corpore anguſto longo niger, thorace faſciis quatuor albicantibus.

Loc. Habitat carduum.

2. R. viridis.

Le Becmare vert.

Long. 3 lig. Larg. 3 lig.

R. totus viridi-ſericeus.

Loc.

3. R. auratus.

Le Becmare doré.

Long. 2 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

R. viridi-auratus, ſubtus nigro-violaceus.

Loc.

4. R. ruber.

Le Becmare doré à étuis rouges.

Long. 1 $\frac{1}{4}$, 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ 1 lig.

R. niger, elytris rubris, capite thoraceque aureis, proboſcide longitudine fere corporis.

Loc.

5. R. cœruleus.

Le Becmare bleu à poil.

Long. 1, 1 $\frac{1}{2}$, 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$, 1, 1 $\frac{1}{4}$ lig.

R. ſubvilloſus cœruleus.

Loc. Habitat flores.

6. R. niger.

Le Becmare non ſtrié.

R. nigro-fuſcus, glaber, punctato-ſtriatus.

Loc. Idem.

7. R. oblongus.

Le Becmare allongé.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

R. nigro-virideſcens, oblongus ſtriatus.

Loc. Habitat umbelliferarum flores.

8. R. fulvipes.

Le Becmare noir à pattes fauves.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

R. ſubglobofus, niger, ſtriatus, femoribus rufis.

Loc. Habitat flores.

9. R. minutus.

Le Becmare puce.

Long. $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

R. ſubglobofus, villoſus, niger, pedibus elytriſque rufis.

Loc. Idem.

10. R. coccineus.

Le Becmare laque.

Lon. 1 $\frac{1}{2}$, 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$, 1 $\frac{1}{4}$ lig.

R. niger, thorace elytriſque rubris, proboſcide longitudine capitis.

Loc.

11. R. coryli.

La Tête écorchée.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

R. niger, thorace elytriſque rubris, capite pone elongato.

Loc. Habitat corylum.

* 12. R. ſtriatus.

Le Becmare noir à trompe fauve.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

R. oblongus, nigro cupreus; pedibus & proboſcide fulvis, punctis elytrorum per ſtrias digeſtis.

Loc.

* 13. R. fulgidus.

Le Becmare rouge.

Long. 1 ½ lig. Larg. 1 lig.

R. ovatus, ſtriatim punctatus, ſupra ruber, infra cupreus; antennis, proboſcide pedibuſque nigris.

Loc.

XXXIV. CURCULIO. *Le Charanson.*

Antennæ clavatæ fractæ, roſtro longo corneo inſidentes.

Famil. I. *Femoribus inermibus.*

1. C. nebuloſus.

Le Charanſon à trompe ſillonnée.

Long. 6 lig. Larg. 2 lig.

C. albo nigroque varius, proboſcide planiuſculâ carinatâ, thoracis longitudine.

Loc. Habitat arbores.

2. C. rugoſus.

Le Charanſon ridé.

Long. 4 lig. Larg. 2 lig.

C. totus fuſcus rugoſus.

Loc. Habitat prata.

3. C. ſulcatus.

Le Charanſon à corcelet ſillonné.

Long. 3 ½ lig. Larg. 2 lig.

C. fuſco-nebuloſus, thorace ſulcato; elytris ſtriatis.

Loc. Idem.

4. C. paraplecticus.

Le Charanſon à ſuture noire.

Long. 5 lig. Larg. 1 ½ lig.

C. oblongus, elytris villoſo-cinereis, ſuturâ nigrâ.

Loc.

5. C. pictus.

Le Charanſon à côtes tachetées.

Long. 3 ½ lig. Larg. 1 ⅔ lig.

C. fuſcus, fulvo maculatus; elytris ſtriatis, ſtriis alternatim nigro maculatis.

Loc. Habitat loca arida.

6. C. bipunctatus.

Le Charanſon à deux points blancs.

Long. 4 lig. Larg. 1 ½ lig.

C. oblongus, fuſcus thoracis lateribus albidis, elytris ſtriatis puncto albo.

Loc.

7. C. faſciatus.

Le Charanſon à deux bandes tranſverſes.

Long. 9 lig. Larg. 4 lig.

C. nigro-fuſcus, thorace utrinque faſciâ longitudinali, elytris duplici tranſverſâ cinereâ.

Loc. Habitat carduum.

8. C. cardui.

Le Charanſon tacheté des têtes de chardon.

Long. 2 ½, 4 lig. Larg. 1 ¼, 2 lig.

C. niger, ſtriatus, maculis villoſo-fuſcis nebuloſus.

Loc. Idem.

9. C. elegans.

Le Charanſon brodé.

Long. 2 ⅔ lig. Larg. 1 ¼ lig.

C. niger, thorace punctato, elytris alternatim ſtriatis & punctatis.

Loc.

10. C. incanus.

Le Charanſon gris, ſtrié & ſans aîles.

Long. 2 $\frac{1}{2}$, 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$, 2 $\frac{1}{4}$ lig.

C. cinereus, ſquamoſus, alis carens, elytris ſtriatis.

Loc. Habitat hortos, flores, arbores; abundans.

11. C. inciſus.

Le Charanſon noir à ſillons.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{5}$ lig.

C. oblongus, totus niger, thorace punctato, elytris ſulcatis.

Loc.

12. C. argentatus.

Le Charanſon à écailles vertes, & pattes fauves.

Long. 2, 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$, 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. ſquamoſo-viridis, roſtro thorace breviore, pedibus rufis.

Loc. Habitat hortos, arbores, &c.

13. C. faſciolatus.

Le Charanſon à corcelet rayé.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. roſtro thoracis longitudine, thorace tribus ſtriis pallidioribus.

Loc. Habitat arbores ſepium.

14. C. interſectus.

Le Charanſon écailleux à bandes.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. roſtro thorace breviore, ſquamis nitentibus, thoracis elytrorumque faſciis longitudinalibus.

Loc. Habitat flores.

15. C. modeſtus.

Le Charanſon griſette.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{5}$ lig.

C. rufus, ſubvilloſus, capite nigricante, roſtro thorace breviore.

Loc. Idem.

16. C. viridis.

Le Charanſon ſatin-vert.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C.

C. cœruleo-viridis nitens, thorace punctato, elytris ſtriatis.

Loc. Habitat cruciferas.

17. C. funereus.

La Pleureuſe.

Long.

C. oblongus, niger; abdomine ſquamoſo, lateribus albis.

Loc.

18. C. granarius.

Le Charanſon brun du bled.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. rufo-teſtaceus oblongus, thorace elytrorum fere longitudine.

Loc. Habitat grana; horræis infeſtus.

19. C. ſaltator.

Le Charanſon ſauteur brun.

C. rufus, femoribus poſticis craſſioribus, elytris rufis.

Loc. Habitat ulmum.

F

20. C. alni.

Le Charanſon ſauteur à taches noires.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. rufus, femoribus poſticis craſſioribus, elytris maculis quatuor nigris.

Loc. Habitat ulmum & alnum.

21. C. quadrilis.

Le Charanſon quadrille à courte trompe.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. cinereus elytrorum puncto quadruplic i nigricante, proboſcide thorace breviore.

Loc.

22. C. 5-maculatus.

Le Charanſon quadrille à longue trompe.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. cinereus, elytrorum puncto quadruplici albo, proboſcide thorace longiore.

Loc.

23. C. communis.

Le Charanſon ſatin gris.

Long. 1 ½ lig. Larg. 1 lig.

C. niger, ovatus, ſtriatus, totus villoſo-cinereus, thorace inermi.

Loc

24. C. armatus.

Le Charanſon à corcelet épineux.

Long.

C. ovatus, nigro-cinereus, thorace utrinque denticulato.

Loc.

25. C. pultiaris.

Le Charanſon à bandes blanches.

Long. Larg.

C. ſubrotundus, niger, ſquamoſus, elytris ſtriatis; thorace utrinque occuleato, lateribus lineâque mediâ albis.

Loc.

26. C. ſtoriger.

Le Charanſon noir ſtrié.

Long. 1 lig. Larg. ½ lig.

C. ſubgloboſus, cinereo-ater, ſtriatus, proboſcide thoracis longitudine.

Loc. Habitat flores.

27. C. cinctus.

Le Charanſon roux à bande tranſverſale blanche.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. globoſus rufus, elytris ſtriatis, faſciâ tranſverſâ albâ.

Loc.

28. C. vittatus.

Le Charanſon noir à bande tranſverſale blanche.

C. globoſus niger, elytris ſtriatis, faſciâ tranſverſâ albâ.

Loc. Habitat ſalicem.

29. C. murinus.

Le Charanſon ſouris.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. ſubvilloſo-murinus, ſcutello albicante.

Loc.

30. C. ſpinifer.

Le Charanſon à côtes épineuſes.

Long. $1\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. totus fuſcus ſpinoſus, elytris ſtriis elevatis villoſo-ſpinoſis.

Loc.

31. C. denticulatus.

Le Charanſon noir à côtes.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. niger, ſcutello albicante, elytrorum ſtriis utrinque denticulatis.

Loc.

32. C. acridulus.

Le Charanſon pyriforme.

Long. $1\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. pyriformis, nigro-cœruleſcens, abdomine ovato.

Loc. Habitat flores.

33. C. marmoratus.

Le Charanſon marbré à bandes.

Long. $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

C. lividus, coleoptris faſciis plurimis obſcuris.

Loc. Habitat flores ſalicariæ.

FAMIL. II. *Femoribus denticulatis.*

34. C. coronatus.

Le Charanſon à corcelet couronné.

Long. 6 lig. Larg. 2 ½ lig.

C. niger apterus, thorace utrinque puncto duplici fulvo, baſi pilis fulvis coronatâ.

Loc.

* 35. C. ſcabroſus.

Le Charanſon noir chagriné.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

C. totus niger, nitidus, elytris ſtriatis ſubrugoſis.

Loc.

36. C. tigrinus.

Le Charanſon tigré.

Long. 6 lig. Larg. 3 lig.

C. niger, maculis villoſo-flavis, elytris ſubrugoſis.

Loc. Habitat Normanniam.

* 37. C. contractus.

Le Charanſon levrier.

Long. 2 lig. Larg. ⅔ lig.

C. oblongus, totus niger, thorace punctato, elytris ſtriato-punctatis.

Loc.

38. C. monopterus.

Le Charanſon gris à étuis réunis & chagrinés.

Long. 6 lig. Larg. 2 ½ lig.

C. cinereus, ſquamoſus, alis carens, elytris rugoſis.

Loc.

* 39. C. fuſcipes.

Le Charanſon noir à pattes brunes.

Long. 1 lig. Larg. ½ lig.

C. niger ſtriatus, pedibus fuſcis.

Loc.

40. C. rugoſiſſimus.

Le Charanſon cartiſanne.

Long. 3, 4 ½ lig. Larg. 1 ½, 2 ½ lig.

C. fuſcus, apterus, elytris rugoſo-ſtriatis.

Loc.

41. C. auratus.

Le Charanſon à écailles vertes.

Long. 4 lig. Larg. 1 ½ lig.

C. ſqamoſus, viridi-auratus.

Loc. Habitat hortos, arbores.

42. C. querneus.

Le Charanſon à étuis fauves.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. oblongus, niger, elytris pedibuſque teſtaceis.

Loc. Habitat arbores.

43. C. geographicus.

Le Charanſon géographie.

Long. 2 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. ſubgloboſus, nigro-fuſcus, ſquamoſus, lineolis albis variegatus.

Loc. Habitat viperinam.

44. C. ſtellifer.

Le Charanſon brun à bandes tranſverſes de taches blanches.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. fuſcus, elytris ſtriatis macularum albarum faſciâ triplici tranſverſâ.

Loc.

45. C. nucum.

Le Charanſon trompette.

Long. 2, 3, 3 ½ lig. Larg. 1, 1 ½, 2 ⅔ lig.

C. rufo-marmoratus, ſcutello cordato albo, proboſcide ſubulatâ longiſſimâ.

Loc. Habitat nuces.

46. C. teſſelatus.

Le Charanſon damier.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. flaveſcens, elytris luteo & rufo teſſelatis.

Loc.

47. C. ſcrophularis.

Le Charanſon à lozange de la ſcrophulaire.

Long. 3 lig. Larg. 1 ½ lig.

C. ſubgloboſus niger, punctis duobus atris futuræ longitudinalis coleoptrorum, thorace exalbido.

Loc. Habitat ſcrophulariam.

48. C. hortulanus.

Le Charanſon gris de la ſcrophulaire.

Long. 1 ½ lig. Larg. ¾ lig.

C. ſubgloboſus, cinereus, punctis duobus nigris ſuturæ longitudinalis coleoptrorum.

Loc. Habitat ſcropuularíam.

49. C. pericarpius.

Le Charanſon porte-cœur de la ſcrophulaire.

Long. 1 lig. Larg. ½ lig.

C. ſubgloboſus; fuſco-nebuloſus, maculâ cordatâ albâ in medio dorſo.

Loc. Idem.

50. C. tripunctatus.

Le Charanſon brun à points blancs.

C. ſubgloboſus, ſquamoſus, cinereo-fuſcus elytrorum maculis tribus & apice albis.

Loc. Habitat prata.

51. C. armiger.

Le Charanſon noir à corcelet armé.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. niger, thorace utrinqe dentato.

Loc.

52. C. plebeius.

Le Charanſon noir à corcelet ſans points.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. fuſco-niger thorace inermi.

Loc.

53. C. ſcutellatus.

Le Charanſon brun à écuſſon blanc.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. fuſcus, ſcutello puncto albo, elytris maculâ rubeſcente.

Loc.

54. C. rubigineus.

Le Charanſon couleur de rouille.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. ferrugineus, elytris ſtriatis, oculis nigris.

Loc.

55. C. villoſus.

Le Charanſon velouté.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. obſcure rufus, villis cinereis aſperſus, roſtro, thorace breviore.

Loc.

56. C. virgo.

Le Charanſon vierge.

Long. 1 lig. Larg. ½ lig.

C. oblongus, villis cinereis aſperſus, roſtro thoraci æquali.

Loc. Habitat flores.

* 57. C. punctulatus.

Le Charanſon noir picoté.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

C. totus niger, oblongus, thorace punctato, elytris punctato-ſtriatis, femoribus denticulatis.

Loc.

* 58. C. cordifer.

Le Charanſon à cœur.

Long. 1 ½ lig. Larg. ⅔ lig.

C. cinereus, ſcutello albo, faſciâque elytrorum interruptâ albâ, proboſcide longiſſimâ.

Loc.

59. C. faſciatus.

Le Charanſon faſcié.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

C. fuſco-cinereus villoſus elytrorum ſuturâ maculiſque albis.

Loc.

XXXV. BOSTRICHUS. *Le Bostriche.*

Antennæ clavatæ, clavâ ex articulis tribus compoſitâ, capiti inſidentes.

Roſtrum nullum.

Thorax cubicus caput intra ſe recondens.

Tarſi nudi ſpinoſi.

1. B. ruber.

Le Boſtriche.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

B. niger, elytris rubris.

Loc. Habitat ſylvas.

* 2. B. fuſcus.

Le Boſtriche brun.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

B. fuſcus, thorace coſtis, elytris ſtriis punctatis elevatis.

Loc.

XXXVI. CLERUS. *Le Clairon.*

Antennæ clavatæ, clavâ ex articulis tribus compoſitâ, capiti inſidentes.

Roſtrum nullum.

Thorax ſubcylindraceus, non marginatus.

Tarſi ſpongioſi.

1. C. apiarius.

Le Clairon à bandes rouges.

Long. 6 lig. Larg. 2 lig.

C. nigro-violaceus, hirſutus, elytris faſciâ triplici coccineâ.

Loc. Larva nidos apium habitat, clerus flores.

2. C. violaceus.

Le Clairon bleu.

Long. 1 $\frac{1}{2}$, 2, 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$, 1, 1 $\frac{1}{4}$ lig.

C. nigro-cœruleus.

Loc. Larva & clerus putrida loca habitat frequens in domis.

3. C. cruciger.

Le Clairon porte-croix.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

C. fuſcus, villoſus, elytris flavis cruce fuſcâ.

Loc. Habitat flores.

4. C. villoſus.

Le Clairon ſatiné.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. niger, ſubovatus, villis cinereis.

Loc. Habitat flores reſedæ.

* 5. C. faſciatus.

Le Clairon porte-livrée.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

C. niger villoſus, elytrorum faſciâ anticâ rufâ, poſticâ albâ.

Varietas A. Id. thorace rufo.

Long. 3 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. 1 lig.

B. Id. niger ſubvilloſus, elytrorum faſciâ anticâ rufâ, mediâ flavâ, poſticâ albâ.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

Loc. Habitat arbores vetuſtas.

* 6. C. maculatus.

Le Clairon à taches jaunes.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

C. fuſco-niger ſubvilloſus, elytro ſingulo maculis duabus flavis.

Loc.

XXXVII. ANTRIBUS. *L'ANTRIBE.*

Antennæ clavatæ, clavâ ex articulis tribus compoſitâ capiti inſidentes.
Roſtrum nullum.
Thorax latus, marginatus.
Tarſi ſpongioſi.

1. A. marmoratus.

L'Antribe marbré.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{5}$ lig.

A. ovatus, niger, elytris ſtriatis, rubro nigroque marmoratis.

Loc. Habitat jaceam pratenſem.

2. A. variegatus.

L'Antribe minime.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

A. ovatus ſubvilloſus, è fuſco cinereoque variegatus.

Loc. Habitat flores.

3. A. ater.

L'Antribe noir ſtrié.

Long. 6, 7 lig. Larg. 2 $\frac{1}{3}$ lig.

A. ater, elytris apice cineraſcentibus.

Loc. Habitat flores.

4. A. pulicarius.

L'Antribe des fleurs.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

A. niger, elytris abdomine brevioribus.

Loc. Habitat umbelliferas plantas.

5. A. bimaculatus.

L'Antribe à deux points rouges au bout des étuis.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

A. niger ovatus, elytris apice punctis duobus rubris.

Loc. Habitat flores.

6. A. lœvis.

L'Antribe noir liſſe.

Long. $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

A. niger, ovatus, elytris abdomen tegentibus.

Loc. Idem.

* 7. A. fulvus.

L'Antribe fauve.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

A. oblongus, totus rufus.

Loc. Habitat vetuſta ligna.

* 8. A. connexus.

L'Antribe panaché.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

A. oblongus niger ſubvilloſus, elytris maculis connexis luteis.

Loc. Habitat flores.

* 9. A. nitidus.

L'Antribe perlé.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

A. ovatus totus fuſcus.

Loc. Idem.

* 10. A. vittatus.

L'Antribe à bandes.

Long. $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

A. ovatus fuſcus, ſuturâ longitudinali nigrâ.

Loc. Idem.

11. A. pallidus.

L'Antribe paillet.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

A. ovatus, ſubtùs pallidus, ſupra fuſcus ſubvilloſus.

Loc. Habitat flores.

12. A. interſectus.

L'Antribe bigaré.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

A. oblongus ater, elytris ſignaturis albis pedibuſque annulis albis interſectis.

Loc. Idem.

XXXVIII. SCOLYTUS. *Le Scolyte.*

Antennæ clavatæ, clavâ ſolidâ. Roſtrum nullum.

1. S. niger.

Le Scolyte.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Lerg. $\frac{2}{3}$ lig.

Loc. Habitat cortices.

XXXIX. CASSIDA. *La Casside.*

Antennæ extrorſum craſſiores, nodoſæ.
Thorax & elytra marginata.
Caput thorace tectum.

1. C. viridis.
La Caſſide verte.
Long. 1, 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$, 1 lig.
C. viridis, corpore nigro.
Loc. Habitat plantas verticillatas & carduos.

2. C. nebuloſa.
La Caſſide brune.
Long. 2, 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.
C. nebuloſa, pallida, corpore nigro.
Loc. Idem.

3. C. nobilis.
La Caſſide à bandes d'or.
Long. 1 $\frac{3}{4}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.
C. pallida, lineâ duplici longitudinali, viridi-deaurata.
Loc. Idem.

4. C. thoracica.

La Caſſide verte à corcelet brun.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

C. viridis, thorace ferrugineo.

Lo. Habitat aſteris varias ſpecies.

5. C. variegata.

La Caſſide panachée.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

C. viridis maculis nigris variegata.

Varietas A. Caſſida rubra maculis nigris variegata.

Loc. Habitat enulam campanam.

XL. ANASPIS. *L'Anaspe.*

Antennæ filiformes ſenſim creſcentes.
Scutellum vix apparens.
Thorax planus, lævis non marginatus.

1. A. nigra.

L'Anaſpe noire.

Long. 1, 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg $\frac{1}{2}$ lig.

A. tota nigra.

Loc. Habitat flores.

2. A. bicolor.

L'Anaſpe à taches jaunes.

A. nigra, elytro ſingulo antice maculâ flavâ.

Loc. Habitat flores.

3. A. thoracica.

L'Anaſpe à corcelet jaune.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{2}{5}$ lig.

A. nigra, thorace luteo.

Loc. Habitat rarior.

4. A. maculata.

L'Anaſpe fauve.

Long. $\frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

A. villoſo-flaveſcens, coleoptrorum maculis tribus obſcuris.

Loc. Idem.

ORDO TERTIUS.

Caract. Ordinis III.

Tarſorum articuli tres.

XLI. COCCINELLA. *LA COCCINELLE.*

Antennæ extrorſum craſſiores, nodoſæ, antennulis breviores.
Corpus hæmiſphæricum.

1. C. bi-punctata.
La Coccinelle rouge à 2 points noirs.
Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.
C. coleoptris rubris, punctis duobus nigris.
Loc. Habitat alnum; aphivora.

2. C. 5-punctata.
La Coccinelle rouge à 5 points noirs.

C. coleoptris rubis punctis quinque nigris.
Loc. Habitat hortos.

3. C. 7-punctata.
La Coccinelle rouge à 7 points noirs.
Long. 3, 4 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$, 3 lig.

C. coleoptris rubris, punctis ſeptem nigris.

Loc. Habitat tiliam.

4. C. 9-punctata.

La Coccinelle rouge à 9 points noirs & corcelet noir.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

C. coleoptris rubris, punctis novem nigris, thorace nigro, lateribus albis.

Loc. Habitat arbuſta.

5. C. carpini.

La Coccinelle rouge à 9 points noirs & corcelet varié.

C. coleoptris rubris, punctis novem nigris, thorace nigro, antice albo.

Loc. Habitat carpinum.

6. C. 13-punctata.

La Coccinelle rouge à 13 points noirs & corcelet jaune varié.

Long. 2 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C.

C. coleoptris rubris, punctis tredecim nigris.

Loc. Habitat arbuſta.

7. C. trinacris.

La Coccinelle rouge à 13 points noirs & corcelet rouge à bande.

Long. 2 ½ lig. Larg. 2 lig.

C. coleoptris rubris, punctis tredecim nigris, thorace rubro, medio nigro.

Loc. Habitat flores.

8. C. 11-punctata.

La Coccinelle rouge à 11 points & corcelet jaune.

Long. 1 ½, 2 lig. Larg. 1, 1 ½ lig.

C. coleoptris rubris, punctis undecim nigris; thorace luteo nigro punctato.

Loc. Habitat ulmum.

9. C. argus.

La Coccinelle argus.

Long. 3 lig. Larg. 1 ⅓ lig.

C. rubra, punctis undecim nigris, thorace rubro immaculato.

Loc. Habitat ſepes.

10. C. 19-punctata.

La Coccinelle rouge à 19 points noirs.

Long. 2 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. coleoptris rubris, punctis novem decim nigris.

Loc. Habitat ſepes.

11. C. 24-punctata.

La Coccinelle rayée.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. coleoptris rubris, punctis viginti-quatuor nigris, quibuſdam connexis.

Loc. Habitat flores.

12. C. conglobata.

La Coccinelle à bordure.

Long. 2 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. coleoptris rubris, punctis plurimis nigris, quibuſdam connexis ſuturâ longitudinali nigrâ.

Loc. Habitat hortos.

12. C. 14-guttata.

La Coccinelle à 14 points blancs.

Long. 2, 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$. 2 lig.

C. coleoptris rubris, punctis quatuordecim albis.

Loc. Habitat hortos.

14. C. marginata.

La Coccinelle à points & bordure blanche.

Long. 2 ½ lig. Larg. 2 lig.

C. coleoptris rubris, punctis quatuordecim limboque albis.

Loc. Idem.

15. C. 14-punctata.

La Coccinelle à l'échiquier.

Long. 2 ⅓ lig. Larg. 1 ¾ lig.

C. coleoptris flavis, punctis quadratis nigris, quibuſdam connatis.

Loc. Idem.

16. C. 16-punctata.

La Coccinelle jaune à ſuture.

Long. 1 lig. Larg. ¾ lig.

C. coleoptris flavis, punctis ſexdecim nigris, plurimis connexis, ſuturâ nigrâ.

Loc. Idem.

17. C. 22-punctata.

La Coccinelle jaune ſans ſuture.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. coleoptris flavis, punctis viginti nigris.

Loc. Habitat ſepes.

18. C. 14-puſtulata.

La Coccinelle noire à 14 points jaunes.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{5}$ lig.

C. coleoptris nigris, punctis quatuordecim flaveſcentibus.

Loc. Habitat arbores.

19. C. 10-puſtulata.

La Coccinelle noire à 10 points jaunes.

C. coleoptris nigris, punctis decem flaveſcentibus aut rubris.

Loc. Habitat hortos.

20. C. 6-puſtulata.

La Coccinelle noire à points rouges.

Long. 1 $\frac{1}{2}$, 2 lig. Larg. 1 lig.

C. ovata, coleoptris nigris, punctis ſex rubris.

Varietas A. punctis quatuor rubris.
B. punctis duobus rubris.
C. punctis duobus luteis.

Loc. Habitat hortos.

21. C. faſciata.

La Coccinelle velue à bandès.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. ſubvilloſa, nigra, faſciis duabus tranſverſis rubris.

Loc. Habitat flores.

22. C. villoſa.

La Coccinelle velue à points.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. ſubvilloſa nigra, punctis quatuor luteo-rubris.

Loc. Idem.

23. C. interrupta.

La Coccinelle velue à bande interrompue.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. ſubvilloſa nigra, coleoptrorum baſi faſciâ tranſverſâ rubrâ interruptâ.

Loc. Habitat cortices & folia pruni; larva pilis albis & longis conſperſa dicitur, *le Barbet blanc des écorces.*

24. C. pygmæa.

La Coccinelle velue à taches rouges au corcelet.

Long. $\frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. ſubvilloſa nigra, thorace utrinque maculâ rubrâ.

Loc. Habitat flores.

25. C. 4-puſtulata.

La Coccinelle tortue à 4 points rouges.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. rotunda nigra, coleoptrorum margine reflexo, punctis quatuor rubris.

Loc. Habitat urticam.

26. C. 2-puſtulata.

La Coccinelle tortue à bande rouge.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{4}{5}$ lig.

C. rotunda nigra, coleoptrorum margine reflexo, faſciâ tranſverſâ rubrâ.

Loc. Habitat urticam.

* 27. C. teſtudinaris.

La Coccinelle noire à points rouges au corcelet.

C. rotunda nigra, coleoptrorum margine reflexo, thorace utrinque maculâ rubrâ.

Loc. Idem.

* 28. C. 16-guttata.

La Coccinelle à 16 points blancs.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

C. coleoptris rubris, punctis ſexdecim albis.

Loc.

* 29. C. 12-guttata.

La Coccinelle à 12 points blancs.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. 1 lig.

C. coleoptris rubris, punctis duodecim albis.

Loc.

XLII. TRITOMA. *La Tritome.*

Antennæ extrorſum ſenſim craſſiores, antennulis longiores.
Corpus oblongum.

1. T. bimaculata.

La Tritôme.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

Loc. Habitat corticis ſalices; rariſſima.

ORDO QUARTUS.

Caract. Ordin. IV.

Tarſorum primi & ſecundi pedum paris articuli quinque: pedum vero poſteriorum articuli quatuor.

XLIII. DIAPERIS. *La Diapere.*

Antennæ taxiformes, articulis lentiformibus per centrum perfoliatis.
Thorax convexus, marginatus.

1. D. faſciata.

La Diapere.

Long. 3 lig. Larg. 1, 1 $\frac{3}{4}$ lig.

Loc. Habitat ilicem, Fontis-Bellaquæi incola.

XLIV. PYROCHROA. *LA CARDINALE.*

Antennæ uno verſu pectinatæ.

Thorax inæqualis, ſcaber, non marginatus.

1. P. ruberrima.

La Cardinale.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

Loc. Habitat ſepes, autumnalis.

XLV. CANTHARIS. *LA CANTHARIDE.*

Antennæ filiformes.

Thorax inæqualis, ſcaber; non marginatus.

FAMIL. I. *Tarſorum articulis nudis.*

1. C. veſicatoria.

La Cantharide des boutiques.

Long. 4, 5, 8, 9 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$, 2, 3 lig.

C. viridi-aurata antennis nigris.

Loc. Habitat fraxinos.

2. C. attenuata.

La Cantharide à bande jaune.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

C. nigra, elytris attenuatis, antice luteis.

Loc.

FAMIL. II. *Tarſorum articulis ſpongioſis.*

3. C. craſſipes.

La Cantharide verte à groſſes cuiſſes.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. viridi-cœrulea, elytris attenuatis, femoribus poſticis globoſis.

Varietas A. viridi-cœrulea, elytris attenuatis.

Loc. Habitat prata.

4. C. fulva.

La Cantharide fauve à groſſes cuiſſes.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

C. nigra, elytris attenuatis fulvis, femoribus poſticis globoſis.

Loc. Habitat flores.

5. C. villoſa.

La Cantharide jaune veloutée.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

C. flaveſcens, ſubvilloſa, elytris attenuatis.

Loc. Idem.

6. C. flava.

La Cantharide noire à étuis jaunes.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. ſubvilloſa, nigra, elytris flavis, extremo antennarum articulo reliquis triplo majore.

Loc. Habitat ſylvas.

7. C. teſtacea.

La Cantharide fauve avec la pointe des étuis noire.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

C. teſtacea, elytris apice nigris.

Loc.

8. C. formicoides.

La Cantharide fourmi.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

C. fuſca, elytris antice, thoraceque elongato rubris.

Loc.

9. C. variegata.

La Cantharide fourmi panachée.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. nigra, elytris fulvis maculis quinque nigris connexis, thorace elongato.

Loc.

XLVI. TENEBRIO. *Le Ténébrion.*

Antennæ filiformes.

Thorax planus marginatus.

FAMIL. I. *Antennæ articulis globoſis, extrorſum craſſiores.*

1. T. mortiſaga.

Le Ténébrion liſſe à prolongement.

Long. 10 lig. Larg. 4 lig.

T. atra, aptera, coleoptris lævibus, pone acuminatis.

Loc. Habitat plantas coacervatas & exeſas in hortis.

2. T. rugoſa.

Le Ténébrion ridé.

Long. 5 lig. Larg. 3 lig.

T. atra, aptera, coleoptris rugoſis, pone acuminatis.

Loc. Habitat arenam.

3. T. gemellata.

Le Ténébrion à ſtries jumelles.

Long. 4 lig. Larg. 2 ½ lig.

T. nigra, aptera, elytrorum ſtriis octo punctatis per paria diſpoſitis.

Loc. Habitat hortos.

4. T. ſtriata.

Le Ténebrion à 8 ſtries liſſes.

Long. 5 ½ lig. Larg. 1 ½ lig.

T. nigro-fuſca ovata, elytro ſingulo ſtriis octo lævibus.

Loc. Habitat arva.

5. T. cuprea.

Le Ténébrion bronzé.

Long. 5 ½ lig. Larg. 2 lig.

T. nigro-cuprea, elytro ſingulo ſtriis octo, coleoptris pone acuminatis.

Loc. Idem.

6. T. molitoria.

Le Ténébrion à 9 ſtries liſſes.

Long. 7 lig. Larg. 2 ⅓ lig.

T. atra, oblonga, elytris ſtriis novem lævibus.

Loc. Larva farinam habitat; tenebrio domos.

7. T. ſabuloſa.

Le Ténébrion à ſtries dentelées.

Long. 3 lig. Larg. 2 lig.

T. atra, elytris ſtriis quinque utrinque dentatis.

Loc. Habitat putrida loca.

8. T. nigra.

Le Ténébrion noir liſſe.

Long. 3 lig. Larg. 1 ½ lig.

T. nigra, tota lævis, coleoptris pone rotundatis.

Loc. Habitat arenam.

9. T. villoſa.

Le Ténébrion fauve velu.

Long. 1 $\frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

T. tota ferruginea ſubvilloſa.

Loc.

10. T. ferruginea.

Le Ténébrion fauve liſſe.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

T. tota ferruginea lævis.

Loc.

11. T. ſulcata.

Le Ténébrion cannelé.

Long. 7 lig. Larg. 4 $\frac{1}{2}$ lig.

T. atra, aptera rotundata, elytris ſulcis tribus elevatis.

Loc. Habitat provincias Galliæ meridionales.

FAMILIA II. *Antennæ articulis longis, ubique æquales.*

12. T. lutea.

Le Ténébrion jaune.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

T. lutea.

Loc. Habitat flores.

* 12. T. arenaria.

Le Ténébrion à étuis fauves.

Long. 6 ½, 6, 5 ½ lig. Larg. 2 lig.

T. nigra, elytris ſtriatis ferrugineis.

Loc.

* 13. T. rotundata.

Le Ténébrion arrondi.

Long. 3 ½ lig. Larg. 2 lig.

T. nigra-cuprea, elytris ſingulis ſtriis octo punctatis, coleoptris pone rotundatis.

Loc.

* 14. T. globuloſa.

Le Ténébrion à corcelet arrondi.

Long. 6 lig. Larg. 2 lig.

T. atra ſcabra, thorace globoſo.

Loc.

* 15. T. cœrulea.

Le Ténébrion bleu.

Long. 4 ½ lig. Larg. 1 ½ lig.

T. cœrulea punctata, elytris ſtriatis, tarſis fulvis.

Loc.

XLVII. MORDELLA. *La Mordelle.*

Antennæ ſubſerratæ, articulis triangularibus.

Thorax antice attenuatus, convexus.

1. M. aculeata.

La Mordelle noire à pointe.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. atra, caudata, unicolor.

Loc. Habitat flores.

2. M. iriformis.

La Mordelle veloutée à pointe.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

M. atra, caudata, faſciis villoſo-aureis.

Loc. Idem.

3. M. ſtriata.

La Mordelle à étuis jaunes ſtriés.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

M. nigra, elytris fulvis ſtriatis.

Loc. Habitat arbores in ſylvis.

4. T. fulva.

La Mordelle à étuis jaunes ſans ſtries.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

M. nigra, elytris fulvis lævibus.

Loc. Idem.

5. M. flavipes.

La Mordelle brune à pattes fauves.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

M. fuſca, pedibus ferrugineis.

Loc. Idem.

XLVIII. NOTOXUS. *LA CUCULLE.*

Antennæ filiformes.

Thorax cucullatus, dente acuto.

1. C. cucullatus.

La Cuculle.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

Loc. Habitat umbelliferas, rariſſimus.

XLIX. CEROCOMA. *LA CEROCOME.*

Antennæ ultimo articulo clavato: (maſculis complicatæ, in medio pectinatæ).

1. C. viridis.

La Cerocome.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

Loc.

ARTICULUS SECUNDUS.

Caract. articuli II.

Coleoptra dimidiata dura.

ORDO PRIMUS.

Caract. ordinis I.

Tarſorum articuli quinque.

L. STAPHYLINUS. *LE STAPHYLIN.*

Antennæ filiformes.
Alæ tectæ.
Abdomen inerme.

1. S. maxilloſus.

Le grand Staphylin noir liſſe.

Long. 11 lig. Larg. 2 $\frac{3}{4}$ lig.

S. ater, extremo antennarum articulo lunulato.

Loc. Habitat ſylvas, hortos, &c.

2. S. cœruleſcens.

Le Staphylin bleu.

Long. 7 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

S. atro-cœruleſcens, extremo antennarum articulo lunulato.

Loc. Habitat hortos.

3. S. globulifer.

Le petit Staphylin noir.

Long. 6 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

S. ater, extremo antennarum articulo ſubgloboſo, elytris thorace brevioribus.

Loc. Idem.

4. S. macroclytron.

Le Staphylin noir à longs etuis.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

S. ater, elytris thorace duplo longioribus.

Loc. Habitat hortos.

5. S. nebuloſus.

Le Staphylin nébuleux.

Long. 8 lig. Larg. 2 lig.

S. niger, elytris abdomineque cinereo-nebuloſis.

Loc. Habitat bovinas fæces.

6. S. teſſellatus.

Le Staphylin velouté.

Long. 5 ½ lig. Larg. 1 ¾ lig.

S. villoſus, è fuſco cinereoque viridi teſſellatus.

Loc. Habitat hortos.

7. S. hirtus.

Le Staphylin bourdon.

Long. 10 lig. Larg. 3 lig.

S. niger villoſus, capite thorace anoque pilis fulvo-aureis.

Loc. Habitat ſylvas, rarus.

8. S. chryſocephalus.

Le Staphylin à tête jaune.

Long. 5 ¼ lig. Larg. 1 ⅘ lig.

S. pubeſcens, capite flavo, thorace elytriſque fuſco nigroque nebuloſis, punctis impreſſis.

Loc. Habitat arva.

9. S. erytropterus.

Le Staphylin à étuis couleur de rouille.

Long. 6 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

S. ater, non nitens, elytris pedibuſque rufis.

Loc.

10. S. flavopterus.

Le Staphylin noir à étuis fauves & liſſes.

Long. 1, 3, 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ lig.

S. niger nitens, pedibus, elytriſque lævibus teſtaceis.

Varietas A. Staphylinus niger nitens, pedibus elytriſque lævibus teſtaceis, thoracis punctis per ſtrias digeſtis.

Le Staphylin à étuis fauves & corcelet ſtrié.

Loc.

11. S. fulvopterus.

Le Staphylin à étuis marons pointillés.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

S. niger, nitens, pedibus coleoptriſque teſtaceis, elytris punctatis.

Loc.

12. S. brachypterus.

Le Staphylin à étuis très-courts.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

S. niger, nitens, pedibus elytriſque fuſcis punctatis, thorace plano marginato.

Loc.

13. S. compreſſus.

Le Staphylin applati à étuis bruns.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

S. niger, nitens, antennis, pedibus, elytris, anoque teſtaceis, thorace marginato.

Varietas A. Idem; antennis clavatis.

Loc. Habitat flores.

14. S. punctatus.

Le Staphylin noir à pattes fauves & étuis pointillés.

Long. 3 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{5}$ lig.

S. niger, punctatus, antennis pedibuſque ferrugineis.

Loc. Habitat flores.

15. S. rufipes.

Le Staphylin noir à corcelet liſſe & bordé.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

S. niger, thorace marginato lævi, pedibus rufis.

Loc. Habitat arenam.

16. S. ſulcatus.

Le Staphylin noir à corcelet ſillonné & bordé.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

S. niger, thorace marginato ſuturato, pedibus rufis.

Loc. Idem.

17. S. æneus.

Le Staphylin à étuis bronzés.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

S.

S. niger, elytris nigro-æneis.

Loc.

18. S. chryſomelinus.

Le Staphylin couleur de pailles

Long. 1 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

S. niger, thorace, elytris, pedibuſque ſubteſtaceis.

Loc. Habitat arenam.

19. S. marginatus.

Le Staphylin à étuis bordés de jaune.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

S. niger, elytris fuſcis margine flavo.

Loc. Habitat arva.

20. S. maculatus.

Le Staphylin noir à taches jaunes.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

S. niger; thorace utrinque, ſinguloque elytro, maculâ flavâ.

Loc. Idem.

21. S. riparius.

Le Staphylin rouge à tête noire & étuis bleus.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

S. rufus, elytris cœruleis, capite abdominiſque apice nigris.

Loc. Habitat arenam humidam.

22. S. rufus.

Le Staphylin jaune à tête, étuis & anus noirs.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

S. flavus, capite, elytris abdomineque pone nigris.

Loc.

23. S. thoracicus.

Le Staphylin noir à corçelet rouge.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

S. atro-cœruleſcens, thorace rubro.

Loc.

24. S. biguttatus.

Le Staphylin junon.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

S. ater, oculis prominentibus craſſis.

Varietas A. Id. elytro ſingulo puncto flavo.

Loc. Habitat arenam.

25. S. clavicornis.

Le Staphylin à antennes en demi-maſſues.

Long. $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

S. antennis ſubclavatis.

Loc.

* 26. S. melanophtalmos.

Le Staphylin fauve aux yeux noirs.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

S. pallidus, oculis anoque nigris, antennis ſubclavatis.

Loc.

* 27. S. elongatus.

Le Staphylin noir à bandes de points.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

S. niger nitens, elytris punctatis, thorace elongato lævi, ſtriis quatuor punctatis.

Loc.

* 28. S. anguſtatus.

Le Staphylin à corcelet étranglé.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

S. niger, thorace anguſtato fulvo, pedibus fuſcis.

Loc.

* 29. S. variegatus.

Le Staphylin applati à étuis bigarrés.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

S. niger compreſſus, elytris poſtice pedibuſque fuſcis.

Loc.

* 30. S. arenarius.

Le Staphylin à étuis jaunes au milieu.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

S. ater, elytris in medio flaveſcentibus.

Loc.

* 31. S. melonocephalus.

Le Staphylin à tête noire.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

S. fulvus, capite anoque nigris.

Loc.

* 32. S. nigro-fulvus.

Le Staphylin arlequin à longues mâchoires.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

S. niger, thorace pedibus elytrorum abdominiſque baſi fulvis, apice nigris, maxillis longitudine capitis.

Loc.

* 33. S. cupreus.

Le Staphylin cuivreux.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

S. æneus punctatus, elytris veluti teſſelatis.

Loc.

ORDO SECUNDUS.

Caract. ordinis II.

Tarſorum articuli quatuor.

LI. NECYDALIS. *LA NECYDALE.*

Antennæ filiformes.

Alæ nudæ.

1. N. punctata.

La Necydale à points jaunes.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

N. elytris apice puncto flavo.

Varietas A. Necydalis elytris apice puncto flavo, thorace luteo.

B. Necydalis elytris apice puncto flavo, thorace nigro.

Loc. Habitat folia ilicis.

* 2. N. major.

La grande Necydale.

Long. 9 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

N. elytris ferrugineis immaculatis, antennis corpore brevioribus.

Loc.

ORDO TERTIUS.

Caract. ordinis III.

Tarſorum articuli tres.

LII. FORFICULA. *Le Perce-Oreille.*

Antennæ filiformes.
Alæ tectæ.
Abdomen forficibus armatum.

1. F. auricularia.

Le grand Perce-oreille.

Long. 7 lig. Larg. 2 lig.

F. antennarum articulis quatuordecim.
Loc. Habitat hortos, gramina, flores.

2. F. minor.

Le petit Perce-oreille.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

F. antennarum articulis undecim.
Loc. Habitat arenam humidam.

ORDO QUARTUS.

Caract. ordinis IV.

Tarſorum primi & ſecundi pedum paris articuli quinque, pedum vero poſterio-rum articuli quatuor.

LIII. MELOE. *Le Proscarabé.*

Antennæ à medio ad baſim & api-cem decreſcentes.

Alæ nullæ.

1 M. proſcarabeus.
Le Proſcarabé.
Long. 10, 11 lig. Larg. 5 lig.

Loc. Habitat hortos.

ARTICULUS TERTIUS.

Caract. articuli III.

Coleoptra mollia membranacea.

ORDO PRIMUS.

Caract. ordinis I.

Tarſorum primi & ſecundi pedum paris articuli quinque, pedum vero poſteriorum articuli quatuor.

LIV. BLATTA. *La Blatte.*

Antennæ filiformes.
Ad ani latera apendices veſiculoſi tranſverſim ſulcati.

1 B. orientalis.

La Blatte des cuiſines.

Long. 9 lig. Larg. 4 ½ lig.

B. ferrugineo-fuſca, elytris ſulco ovato impreſſis, abdomine brevioribus.

Loc. Habitat loca calida domorum; farinam.

2. B. Aurelianenſis.

La grande Blatte.

Long. 15 lig. Larg. 5 lig.

H v

B. fuſco-flaveſcens, elytris ſulco ovato impreſſis, abdomine longioribus.

Loc. Habitat agrum Aurelianenſem.

3. B. laponica.

La Blatte jaune.

Long. 3 $\frac{1}{2}$, 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

B. flaveſcens, elytris ad angulum acutum ſtriatis.

Loc. Habitat farinam.

ORDO SECUNDUS.

Caract. Ordin. II.

Tarſorum articuli duo.

LV. TRIPS. *Le Trips.*

Antennæ filiformes.
Os rimulâ longitudinali.
Tarſi veſiculoſi.

1. T. juniperina.

Le Trips à pointe.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{6}$ lig.

T. elytris albidis, corpore nigro, abdeminali ſetâ.

Loc. Habitat cortices arbor. vetuſtas.

2. T. phyſapus.

Le Trips noir des fleurs.

Long. $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{10}$ lig.

T. elytris glaucis, corpore atro.

Loc. Habitat flores compoſitos.

3. T. faſciata.

Le Trips à bandes.

T. elytris albis nigriſque faſciis, corpore atro.

Loc. Idem.

ORDO TERTIUS.

Caract. Ordin. III.

Tarſorum articuli tres.

LVI. GRYLLUS. *Le Grillon.*

Antennæ filiformes.
Cauda biſeta.
Ocelli tres.

1. G. grillo-talpa.

La Courtillière ou le Gaupe-Grillon.

Long. 18 lig. Larg. 4 lig.

G. pedibus anticis palmatis.

Loc. Habitat humum recentem, horticolis infeſtus.

2. G. domeſticus.

Le Grillon.

Long. 1 pouce. Larg. 4 lig.

G. pedibus anticis ſimplicibus.

Loc. Habitat loca calida domorum & arva.

LVII. ACRYDIUM. *LE CRIQUET.*

Antennæ filiformes corpore dimidio breviores.

Ocelli tres.

1. A. cyaneum.

Le Criquet à aîles bleues.

Long. 1 pouce. Larg. 2 ½ lig.

A. elytris fuſcis, alis ſubcœruleis.

Loc. Habitat arva ſicca.

2. A. cœruleſcens.

Le Criquet à aîles bleues & noires.

Long. 1 pouce. Larg. 3 lig.

A. elytris nebuloſis, alis cœruleis extimo nigro.

Loc. Habitat prata.

3. A. ſtridulum.

Le Criquet à aîles rouges.

Long. lig. Larg. lig.

A. elytris nebuloſis, alis rubris extimo nigris.

Loc. Habitat vineas.

4. A. groſſum.

Le Criquet enſanglanté.

Long. 5, 10, 11 lig. Larg. 1 ½, 3 lig.

A. femoribus ſanguineis, alis ſubfuſcis reticulatis.

Loc. Habitat arva.

5. A. bi-punctatum.

Le Criquet à capuchon.

Long. 4 lig. Larg. 1 ½ lig.

A. elytris nullis, thorace producto abdomini æquali.

Loc. Idem.

6. A. ſubulatum.

Le Criquet à corcelet allongé.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

A. elytris nullis, thorace producto abdomine longiore.

Loc. Habitat arva.

ORDO QUARTUS.

Caract. Ordin. IV.

Tarſorum articuli quatuor.

LVIII. LOCUSTA. *La Sauterelle.*

Antennæ filiformes corpore longiores. Ocelli tres.

1. L. viridiſſima.

La Sauterelle à ſabre.

Long. 11 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

L. caudâ enſiferâ curvâ.

Loc. Habitat arva & prata.

2. L. vermivora.

La Sauterelle à coutelas.

Long. 22 lig. Larg. 3 lig.

L. caudâ enſiferâ reſtâ.

Loc. Habitat arva & prata.

ORDO QUINTUS.

Caraſt. Ordin. V.

Tarſorum articuli quinque.

LIX. MANTES. *La Mante.*

Antennæ filiformes.

1. M. gongylodes.

La Mante.

Long. 2 pouces. Larg. 5, 6 lig.

Loc. Habitat agrum Aurelianenſem.

SECUNDA SECTIO INSECTORUM.

INSECTA HEMIPTERA.

Caracteres ſectionis.

Alæ ſuperiores elytris accedentes.
Os ſub thorace inflexum.

LX. CICADA. *La Cigale.*

Articuli tarſorum tres.
Antennæ capite breviores.
Ocelli duo.
Roſtrum inflexum.
Alæ quatuor, inferiores cruciatæ.

1. C. nervoſa.
La Cigale à aîles tranſparentes.
Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.
C. fuſca, alis aqueis fuſco maculatis; nervis punctatis.
Loc. Habitat plantas & gramina.

2. C. ſpumaria.
La Cigale bedeaude.
Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. fuſca, elytris faſciâ duplici interruptâ tranſverſâ albidâ.

Loc. Habitat prata & medicaginem.

3. C. lateralis.

La Cygale à bordure.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{5}$ lig.

C. nigra, elytrorum lateribus albis.

Loc. Idem.

4. C. membranacea.

La Cigale à aîles membraneuſes.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. fuſco-pallida, elytris membranaceis venoſis, ſcutello maculâ duplici triangulari.

Loc. Idem.

5. C. viridis.

La Cigale verte à tête panachée.

Long. 2 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. 1 lig.

C. elytris viridibus, capite flavo punctis nigris.

Loc. Idem.

6. C. ſanguinea.

La Cigale à taches rouges.

Long. 4 lig. Larg. 2 lig.

C. nigra, elytris maculis ſex rubris.

Loc. Habitat prata & medicaginem; rarior.

7. C. gibboſa.

La Cigale boſſue.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

C. fuſco-viridis reticulata, alarum baſi dilatatâ.

Loc. Id. rara.

8. C. pallida.

La Cigale pâle.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. flavo-pallida, thorace punctis ſex impreſſis.

Varietas A. Cicada flavo-pallida, oculis nigricantibus.

B. Cicada flavo-pallida, dorſi lineâ longitudinali nigrâ.

C. Cicada flavo-pallida, thoracis poſticâ, ſcutelli anticâ parte, fuſcis.

Loc. Idem.

9. C. interrupta.

La Cigale jaune à raies noires obliques.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. elytris flavis, lineâ abruptâ duplici longitudinali nigrâ.

Loc. Idem.

10. C. regalis.

La Cigale à diadême.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

C. fuſca, capitis thoraciſque faſciâ tranſverſâ flavâ.

Loc. Idem.

11. C. torquata.

La Cigale à collier jaune.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. fuſco-nebuloſa, ſcutelli cavitate rotundâ, thorace punctis luteis impreſſis tranſverſim poſitis.

Loc. Idem.

12. C. variegata.

La Cigale à pattes bigarées.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. fuſco-nebuloſa, ſcutello tranſverſim ſulcato, tibiis poſticis, elytrorumque limbo è flavo fuſcoque variegatis.

Loc. Idem.

13. C. marginata.

La Cigale à tête & bordure jaune.

Long. 2 ½ lig. Larg. 1 lig.

C. fuſco-nebuloſa; capite, thoracis anticâ parte, elytrorumque limbo flavis.

Loc. Habitat prata & medicaginem.

14. C. venoſa.

La Cigale à veines blanches.

Lon. 1 ½, 2 lig. Larg. ⅔ lig.

C. fuſco-nebuloſa punctata, nervis elytrorum albidis.

Loc. Idem.

15. C. nigra.

La Cigale noire.

Long. 2 lig. Larg. 1 ⅓ lig.

C. tota nigra.

Loc. Habitat caſtaneas.

16. C. faſciolata.

La Cigale noire à bandes jaunes ſur le corcelet.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. nigra, thorace elytriſque faſciâ croceâ.

Loc. Habitat prata.

17. C. aurita.

Le grand Diable.

Long. 7 lig. Larg. 2 lig.

C. thorace obtuſe bicorni.

Loc. Habitat prata; rariſſima.

18. C. cornuta.

Le petit Diable.

Long. 4 lig. Larg. 1 ½ lig.

C. thorace acute bicorni, pone producto.

Loc. Habitat in ſylvis filicem, cirſium, ſaltator.

19. C. infernalis.

Le demi-Diable.

Long. 2 lig. Larg. ⅔ lig.

C. thorace inermi pone producto.

Loc. Rar. in agro luteriano; in Campaniâ frequens.

20. C. ſtriata.

La Cigale rayée.

Long. 1 ½ lig. Larg. ⅔ lig.

C. elytris albido nigroque ſtriatis ad angulum acutum ſuturæ dorſalis.

Loc.

21. C. trifaſciata.

La Cigale à 3 bandes brunes.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. fuſca, elytris albidis, faſciis tribus tranſverſis fuſcis.

Variet. A. Eadem elytris unicoloribus, thorace antice punctorum nigrorum faſciâ tranſverſâ.

Loc.

22. C. tranſverſalis.

La Cigale à deux bandes brunes.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. flava, elytrorum faſciis duabus tranſverſis fuſcis.

Loc. Habitat arbores.

23. C. cœca.

La Cigale jaune aux yeux noirs.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. flava compreſſa, oculis nigris.

Loc.

24. C. flammigera.

La Cigale flamboyante.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

Digitized by Google

C. flava, faſciâ duplici longitudinali rubrâ undulatâ.

Loc. Habitat domos.

25. C. carpini.

La Cigale verte à points noirs.

C. viridi-flava, elytris punctis tribus nigris, apice fuſcis.

Loc. Habitat folia arborum.

26. C. geographica.

La Cigale géographie.

C. viridis, elytris maculis plurimis fuſcis ovatis.

Loc. Idem.

27 C. ulmi.

La Cigale moucheron verte.

C. alis viridi-luteis apicibus nigrantibus deauratis.

Loc. Habitat folia ulmi.

28. C. roſæ.

La Cigale des charmilles.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

C. flava, alis albis apicibus membranaceis.

Loc. Habitat arbores & roſam.

* 29 C. nervoptera.

La Cigale à nervures.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. fuſca, thoracis margine flavo; alis aqueis nervis fuſcis.

Loc.

* 30. C. acephala.

La Cigale verte à tête renfoncée.

Long. 2, 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$, 1 lig.

C. tota viridis, capite brevi lato.

Loc.

* 31. C. triſtis.

La Cigale à bandes blanches.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. nigro-fuſca, faſciis quatuor tranſverſis albis, mediâ interruptâ.

Loc.

* 32. C. porrecta.

La Cigale à tête allongée.

Long. 2 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

C.

C. pallida, oculis nigris, capite antice producto acuto, thorace duplo longiori.

Loc.

* 33. C. dilatata.

La Cigale renflée.

Long. 3 lig. Larg. 1 ¼ lig.

C. fuſca, maculis irregularibus albis, elytrorum lateribus dilatatis.

Loc.

CICADA. (1)

LA CIGALE.

Antennæ capite breviores, ſetaceæ, articulis quinque.
Ocelli tres.
Roſtrum inflexum.
Alæ quatuor laterales.
Articuli tarſorum tres.

TETIGONIA *noſtras.*

LA PROCIGALE.

Antennæ capite breviores, articulis duobus globoſo & ſetaceo.
Ocelli duo.
Roſtrum inflexum.
Alæ quatuor, inferiores cruciatæ.
Articuli tarſorum tres.

---

(1) Adduntur hic caracteres *Cicadæ veræ* Galloprovincialis, noſtræ Cicadæ *Tetigonia* vocatæ oppoſiti.

Annumerantur duæ præcipuæ *Cicadæ veræ* ſpecies Gallo-provinciam habitantes, quæ in muſæis noſtris frequentiſſime aſſervantur.

1. *La Cigale à bordure jaune.*

C. fuſca, thoracis & ſcutellis margine flavo, alis nervoſis.

Loc. Habitat Gallo-provinciam.

2. *La Cigale panachée.*

C. fuſca, thorace ſcutelloque flavis, variegatis, alis nervoſo-punctatis.

Loc. Habitat Gallo-provinciam.

LXI. CIMEX. *La Punaise.*

Articuli tarſorum tres.
Antennæ capite longiores articulis quatuor vel quinque.
Roſtrum inflexum.
Alæ quatuor, ſuperiores ſemi-elytra.

FAMIL. I. *Antennarum articuli quatuor.*

1. C. lectularius.
La Punaiſe des lits.

C. apterus.
Loc. Habitat lecta.

2. C. ſcutellatus.
La Punaiſe cuiraſſe.
Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.
C. hemiſphericus nigro-æneus, ſcutello totum abdomen tegente, ampliſſimo.
Loc. Habitat viciam multifloram fontis Bellaquæi.

3. C. teſtudinarius.
La Punaiſe tortue brune.
Long. 3 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.
C. fuſcus, ſcutello totum abdomen tegente, ampliſſimo.
Loc. Habitat ſylvas.

4. C. perſonatus.
La Punaiſe mouche.
Long. 7, 8 lig. Larg. 2 lig.

C. oblongus niger, roſtro arcuato, antennis apice capillaceis, elytris membranaceis.

Loc. Habitat domos.

5. C. annulatus.

La Punaiſe mouche à pattes rouges.

Long. 5 ½ lig. Larg. 1 ½ lig.

C. oblongus niger, roſtro arcuato, elytris membranaceis, pedibus abdomineque rubro nigroque variegatis.

Loc. Habitat ſylvas.

6. C. bidentatus.

La Punaiſe porte-épine.

Long. 6 lig. Larg. 1 lig.

C. longus, fuſcus, roſtro arcuato, thorace ſubtùs antice bidentato.

Loc. Habitat plantas, rarus.

7. C. pellucidus.

La Punaiſe brune à étuis tranſparens.

Long. 1 lig. Larg. ½ lig.

C. oblongus, fuſco-niger, pedibus pallidis, elytris pellucidis apice fuſco.

Loc.

8. C. boopis.

La Punaiſe marbrée aux gros yeux.

Long. 1 ½ lig. Larg. ½ lig.

C. oblongus, luteo nigroque marmoratus, oculis craſſiſſimis.

Loc.

9. C. leviatan.

La Punaiſe leviatan.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. planus, fuſcus, thorace elytriſque alatis, capite antice cornuto, antennis brevibus craſſis.

Loc.

10. C. eryngii.

La Punaiſe rouge à taches triangulaires.

Long. 3 ½ lig. Larg. 1 ¼ lig.

C. oblongus niger, thorace elytriſque rubris, elytrorum extremo maculâ triangulari nigrâ.

Loc. Habitat folia Eryngii.

11. C. apterus.

La Punaiſe rouge des jardins.

Long. 3 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus, rubro nigroque variegatus, elytris maculâ rotundâ, punctuloque nigris.

Loc. Habitat arborum infimam partem, multiplex.

12. C. hyoſciami.

La Punaiſe rouge à croix de chevalier.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. oblongus, rubro nigroque variegatus, ſcutelli nigri apice rubro.

Loc. Habitat folia hyoſciami.

13. C. ſtellifer.

La Punaiſe rouge à baſe des aîles blanches.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

C. oblongus, rubro nigroque variegatus, centro crucis albo.

Loc. Habitat hortos.

14. C. equeſtris.

La Punaiſe rouge à bandes noires & taches blanches.

Long. 5 lig. Larg. 1 ¾ lig.

C. oblongus, rubro nigroque variegatus, elytris faſciâ nigrâ, alis fuſcis maculis albis.

Loc.

15. C. nobilis.

La Punaiſe rouge à point noir & taches blanches.

Long. 3 lig. Larg. 1 ¼ lig.

C. oblongus, rubro nigroque variegatus, elytris punctulo nigro, alis fuſcis maculis albis.

Loc.

16. C. teſſellatus.

La Punaiſe rouge à damier.

Long. 4 lig. Larg. 1 ½ lig.

C. oblongus, thorace nigro lineis tribus rubris, elytris rubro nigroque teſſelatis, limbis nigris.

Loc. In Campaniâ multiplex.

17. C. croceus.

La Punaiſe ſafranée.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. croceus, elytrorum apice rubro, alis nigris, antennarum articulo ſecundo clavato.

Variet. A. Cimex niger, pedibus rufis, antennarum articulo ſecundo clavato.

B. Cimex niger, capite, thorace pedibuſque rufis, antennarum articulo ſecundo clavato.

Loc.

18. C. gothicus.

La Punaiſe rougeâtre à antennes incarnat.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

C. oblongus, fuſco-ruber, elytris apice ſanguineis, antennarum articulo ſecundo longiſſimo incarnato.

Loc.

19. C. variegatus.

La Punaiſe à brocard jaune.

Long. 4 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. 2 lig.

C. oblongus niger, thoracis lateribus ſcutelloque flavis, elytris antennis pedibuſque flavo-variegatis.

Loc.

20. C. marginatus.

La Punaiſe à aîlerons.

Long. 6 lig. Larg. 2 ½ lig.

C. oblongus, fuſcus, immaculatus, thorace utrinque obtuſe angulato, capite prope antennas externe denticulato.

Loc.

21. C. roſtratus.

La Punaiſe à bec.

Long. 5 ½ lig. Larg. 2 ½ lig.

C. oblongus, fuſcus, immaculatus, thorace utrinque obtuſe angulato, capite inter antennas bidentato.

Loc.

22. C. acutus.

La Punaiſe brune à corcelet pointu & liſſe.

Long. 9 lig. Larg. 2 lig.

C. oblongus rufus, immaculatus, thorace utrinque acute angulato; margine lævi.

Loc.

23. C. fimbriatus.

La Punaiſe brune à corcelet pointu & épineux.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus, rufus, immaculatus, thorace utrinque acute angulato, margine ſpinoſo.

Loc.

24. C. chelifer.

La Punaiſe à pattes de crabes.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus fuſcus, pedibus primi paris cheliformibus.

Loc. Habitat ſylvas.

25. C. ſabuloſus.

La Punaiſe à nervures pointillées.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

C. oblongus, viridi-fuſcus, elytrorum nervis punctatis, antennis rufis.

Loc.

26. C. monilis.

La Punaiſe brune à antennes & pattes panachées.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. oblongus, fuſcus, antennis, pedibus abdominiſque marginibus nigro luteoque variegatis.

Loc.

27. C. cathariæ.

La Punaiſe griſe panachée de noir.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

C. oblongus, cinereo nigroque variegatus, alis glaucis.

Loc. Habitat labiatas, præcipue cathariam.

28. C. crucifer.

La Punaiſe griſe porte-croix.

C. oblongus niger, thorace poſtice cinereo, elytris cinereis, maculâ nigrâ, aliſque nigris.

Loc. Habitat arida loca.

29. C. apicaris.

La Punaiſe brune à pointe des étuis blanche.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. oblongus niger, thorace poſtice cinereo, elytris fuſcis apice albo.

Loc.

30. C. femoralis.

La Punaiſe verdâtre à cuiſſes pointillées.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus, pallide-virideſcens, femoribus nigro-punctatis.

Loc.

31. C. conſtellaris.

La Punaiſe noire à taches fauves & aîles panachées.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

C. oblongus, niger, elytris antice rufis, alis albo maculatis.

Loc. Habitat cortices arborum.

32. C. fuligineus.

La Punaiſe brune ponctuée.

Long. 1 lig. Larg. ½ lig.

C. oblongus, atro-fuſcus punctatus, alis venoſis.

Loc.

33. C. pratenſis.

La Punaiſe gris-fauve porte-cœur.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

C. griſeus, ſcutello maculâ cordatâ flavâ, elytris apice puncto fuſco.

Loc.

34. C. campeſtris.

La Punaiſe verte porte-cœur.

Long. 1 ½ lig. Larg. ⅔ lig.

C. oblongus, viridis, ſcutello maculâ cordatâ viridi, elytris maculâ ferrugineâ.

Varietas A. Cimex oblongus, fuſco-luteus, ſcutello maculâ cordatâ viridi, elytris faſciâ duplici fuſcâ.

Loc. Habitat flores.

35. C. cordatus.

La Punaiſe porte-cœur à taches jaunes au bout des étuis.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus, fuſco-ruber, ſcutello maculâ cordatâ luteâ, elytris apice luteis.

Loc.

36. C. porrectus.

La Punaiſe jaune à antennes droites.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. oblongus, flaveſcens, thorace faſciis duabus nigris, ſcutello maculis flavis, antennis antice porrectis.

Loc.

37. C. ternatus.

La Punaiſe à trois taches.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. oblongus niger, thorace faſciis tribus flavis, ſcutello elytrorumque apice maculis luteis.

Loc.

38. C. ſtriatus.

La Punaiſe rayée de jaune & de noir.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

C. oblongus niger, thorace faſciis tribus flavis, ſcutello nigro, elytris flavis apice fulvo.

Loc.

39. C. nigro-punctatus.

La Punaiſe jaune à corcelet tacheté & étuis verts.

Larg. 3 lig. Larg. 1 lig.

C. oblongus viridi-flavus, capite thoraceque nigro maculatis, elytris viridibus.

Loc.

40. C. virideſcens.

La Punaiſe verdâtre à tache brune.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

C. oblongus viridis, elytrorum maculâ fuſcâ.

Loc.

41. C. albinus.

La Punaiſe verdâtre à taches blanches.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

C. oblongus viridis, elytrorum apice albido, ſcutello lineolâ fuſcâ.

Loc.

42. C. elongatus.

La Punaiſe verdâtre à bande brune.

Long. 3 ½ lig. Larg. 1 lig.

C. oblongus viridis, thorace ſcutelloque lineis quatuor nigris, elytris interne fuſcis.

Loc.

43. C. æruginεus.

La Punaiſe verte aux yeux bruns.

Long. 3 lig. Larg. 1 ¼ lig.

C. oblongus, totus viridis, oculis fuſcis.

Loc.

44. C. cruentatus.

La Punaiſe verte enſanglantée.

Long. 3 ¼ lig. Larg. 1 ½ lig.

C. oblongus viridis, elytrorum lineis ſanguineis.

Loc.

45. C. ruficornis.

La Punaiſe verte à antennes fauves.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus, pallido-viridis, antennis ſetaceis rufis.

Loc.

46. C. lateralis.

La Punaiſe blanchâtre aux yeux noirs.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. longus albidus, oculis nigris.

Loc.

47. C. recticornis.

La Punaiſe verte à antennes droites.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. longus totus viridis antennis antice porrectis.

Loc.

48. C. ſponſalis.

La Punaiſe pâle à tache noire ſur l'écuſſon.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. longus, albidus, oculis fuſcis ſcutello maculâ nigrâ.

Loc.

49. C. conicus.

La Punaiſe griſe conique.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

C. oblongus conicus, fuſco-cinereus, oculis prominentibus, elytris nervoſis.

Loc. Habitat hortos.

50. C. flammeus.

La Punaiſe noire à pointe des étuis rouges.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. oblongus niger, capite, elytrorum apice, genubuſque ferrugineo-rubris.

Loc.

51. C. rolandri.

La Punaiſe couleur de ſuie à aîles jaunes.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

C. oblongus atro-fuſcus, alarum maculâ flavâ.

Loc.

52. C. plæſſæus.

La Punaiſe noire à pattes panachées.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. oblongus niger, pedibus viridi nigroque variegatis.

Loc.

53. C. atramentarius.

La Punaiſe toute noire.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus totus ater, alis atris.

Loc.

54. C. ater.

La Punaiſe à groſſes antennes terminées par un fil.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. oblongus ater, antennis ſetâ terminatis.

Loc. Habitat ſylvas.

55. C. carthuſianus.

La Punaiſe chartreuſe.

Long. 2 lig. Larg $\frac{3}{4}$ lig.

C. oblongus, infra niger, ſupra albo-lacteus, antennis craſſis antice porrectis, capite pedibus antenniſque nigris.

Loc. Habitat Eryngium.

56. C. clavicornis.

La Punaiſe tigre.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. ex albo fuſcoque cinereus, elytrorum thoraciſque margine punctato antennis ſubclavatis.

Loc. Larva flores chamædrys diſtendit.

57. C. appendiceus.

La Punaiſe à fraiſe antique.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. 1 lig.

C. antennis clavatis, thorace elytriſque corpore multo latioribus diaphanis, reticulatis, faſciâ duplici tranſverſâ.

Loc.

58. C. vagabundus.

La Punaiſe culiciforme.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. linearis pedibus anticis breviſſimis, cœteris antenniſque filiformibus longiſſimis, albo fuſcoque variis.

Loc. Habitat arbores.

59. C. lacuſtris.

La Punaiſe nayade.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{4}{5}$ lig.

C. linearis ſuprà niger, pedibus anticis breviſſimis.

Loc. Habitat aquarum ſtagnantium ſuperficiem.

60. C. ſtagnorum.

La Punaiſe aiguille.

Long. 5 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

C. linearis nigricans compreſſus, capite cylindraceo, pedibus anticis breviſſimis.

Loc. Habitat ſtagna.

FAMIL. II. *Antennarum articuli quinque.*

61. C. juniperinus.

La Punaiſe verte.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

C. ſubrotundus viridis.

Loc. Fetidiſſimus, habitat groſſulariam.

* 62. C. tridentatus.

La Punaiſe à trois cornes.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. planus, depreſſus, atro-fuſcus, capite antice tridentato, thoracis margine ſerrato, elytris parvis.

Loc.

63. C. carminaris.

La Punaiſe verte lavée de rouge.

Long. 6 lig. Larg. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

C. ovatus, thorace obtuſe angulato, è viridi rubroque nebuloſus.

Loc.

* 64. C. biclavatus.

La Punaiſe à double maſſe.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus lividus, antennarum articulo primo & extremo clavatis.

Loc.

65. C. pungens.

La Punaiſe verte à pointes du corcelet rouges.

Long. 6 lig. Larg. 3 lig.

C. ſubovatus viridis, angulis thoracis acutis rubris apice nigris, abdomine ſubtus acuto.

Loc.

66. C. baccarum.

La Punaiſe brune à antennes & bords panachés.

Long. 6 lig. Larg. 3 lig.

C. fuſcus, antennis abdominiſque margine nigro croceoque variegatis.

Loc. Habitat groſſulariam, fetidus.

67. C. annularis.

La Punaiſe brune à pattes panachées.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

C. fuſcus, pedibus abdominiſque limbo luteo fuſco variegatis.

Loc.

68. C. ſecalinus.

La Punaiſe porte-chappe brune.

Long. 5 ½ lig. Larg. 3 ½ lig.

C. nigro-ferrugineus, ſcutello ad anum uſque producto.

Loc. Habitat ſecale & gramina.

69. C. cappatus.

La Punaiſe porte-chappe noire.

Long. 5 ½ lig. Larg. 3 lig.

C. ater punctatus, ſcutello ad anum uſque producto.

Loc. Habitat domos.

70. C. italicus.

La Punaiſe ſiamoiſe.

Long. 4 lig. Larg. 3 lig.

C. rotundatus ruber, ſupra faſciis longitudinalibus, infra punctis nigris, ſcutello amplo totum fere abdomen tegente.

Loc.

71.

71. C. ornatus.

La Punaiſe rouge du chou.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 3 lig.

C. rotundato-ovatus, nigro rubroque variegatus, capite aliſque nigris.

Loc. Habitat braſſicam.

72. C. carbonarius.

La Punaiſe noire.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

C. ovatus, totus niger, alis pallidis.

Loc.

73. C. fumoſus.

La Punaiſe brune luiſante.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. ovatus, fuſco-niger, alis pallidis.

Loc.

74. C. limboſus.

La Punaiſe noire à bordure blanche.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. ovatus niger, elytrorum limbo exteriore albo.

Loc.

75. C. bicolor.

La Punaiſe noire à quatre taches blanches.

Long. 3 lig. Larg. 2 lig.

C. ovatus niger, thoracis lateribus, elytrorumque maculis quatuor albis.

Loc.

76. C. oleraceus.

La Punaiſe verte à raies & taches rouges ou blanches.

Long. 3 lig. Larg. 2 lig.

C. ovatus cœruleſcenti-æneus, thorace lineolâ, ſcutelli apice, elytriſque puncto albo rubrove.

Loc.

77. C. cœruleus.

La Punaiſe verte bleuâtre.

Long. 3 lig. Larg. $1 \frac{2}{3}$ lig.

C. ovatus, viridi-cœruleus æneus.

Loc.

78. C. ſaltator.

La Punaiſe ſauteuſe.

Long. $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. rotundato-ovatus niger, capite genubuſque ferrugineis, pedibus ſaltatoriis.

Loc.

79. C. acuminatus.

La Punaiſe à tête allongée.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

C. ovatus, antice attenuatus, faſciis longitudinalibus cinereo-exalbidis, antennis extremo rufis.

Loc.

LXII. NAUCORIS. *LA NAUCORE.*

Articuli tarſorum duo.

Antennæ breviſſimæ infra oculos poſitæ.

Roſtrum inflexum.

Alæ quatuor cruciatæ.

Pedes ſex, primi cheliformes.

Scutellum præſens.

1. N. cimicoides.

La Naucore.

Long. 4, 5 lig. Larg. 3 lig.

Loc. Habitat aquam.

LXIII. NOTONECTA. *La Punaiſe a avirons.*

Articuli tarſorum duo.
Antennæ breviſſimæ infra oculos poſitæ.
Roſtrum inflexum.
Alæ quatuor cruciatæ.
Pedes ſex natatorii.
Scutellum præſens.

1. N. glauca.

La grande Punaiſe à avirons.

Long. 6 lig. Larg. 2 lig.

N. capite luteo, elytris fuſco croceoque variegatis, ſcutello atro.

Loc. Habitat aquam.

2. N. minutiſſima.

La petite Punaiſe à avirons.

Long. 1 lig. Larg. ½ lig.

N. cinerea anelytra.

Loc. Idem.

LXIV. CORIXA. *La Corise.*

Articulus tarſorum unicus.
Antennæ breviſſimæ infra oculos poſitæ.
Roſtrum inflexum.
Alæ quatuor cruciatæ.
Pedes ſex, primi cheliformes, poſtici natatorii.
Scutellum nullum.

1. C. ſtriata.
La Coriſe.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.
Loc. Habitat rivulos & ſtagna, fetidiſſima.

LXV. HEPA. *Le Scorpion aquatique.*

Articulus tarſorum unicus.
Antennæ cheliformes.
Roſtrum inflexum.
Alæ quatuor cruciatæ.
Pedes quatuor.

1. H. linearis.

Le Scorpion aquatique à corps allongé.

Long. 13 lig. Larg. 1 lig.

H. corpore lineari.

Loc. Habitat aquam ſtagnantem.

2. H. cinerea.

Le Scorpion aquatique à corps ovale.

Long. 8, 9 lig. Larg. 3 lig.

H. corpore ovato.

Loc. Idem.

LXVI. PSYLLA. *La Psylle.*

Articuli tarſorum duo.
Roſtrum pectorale inter primum & ſecundum par femorum.
Alæ quatuor laterales.
Pedes ſaltatorii.
Abdomen acuminatum.
Ocelli tres.

1. P. ficûs.

La Pſylle du figuier.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

P. fuſca, antennis craſſis piloſis, alarum nervis fuſcis.

2. P. chermes buxi.

La Pſylle du buis.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

P. viridis, antennis ſetaceis, alis fuſco-flaveſcentibus.

3. P. ulni.

La Pſylle de l'aune.

P. viridis, antennis ſetaceis, alis aqueis.

4. P. fraxini.

La Pſylle du frêne.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

P. nigro luteoque variegata; alarum oris in apice fuſcis.

5. P. abietis.

La Pſylle du ſapin.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

P. pallidè flaveſcens, oculis fuſcis, alis aqueis.

6. P. pini.

La Pſylle du pin.

Long. Larg.

P. lanata pini.

7. P. lapidum, ſeu lichenis.

La Pſylle des pierres.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

P. fuſca, nigro punctata, antennis corpore longioribus, alis nervoſis fuſco maculis.

8. P. fuſca.

La Pſylle brune à antennes ſétacées & aîles nerveuſes.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

P. fuſca, antennis ſetaceis lævibus, alis nervoſis.

9. P. rubra.

La Pſylle rouge.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

P. rubra, alis nervoſis.

Loc.

LXVII. APHIS. *Le Puceron.*

Articulus tarſorum unicus.
Roſtrum inflexum.
Alæ quatuor erectæ vel nullæ.
Pedes ambulatorii.
Abdomen bicorne.

1. A. ulmi.
Le Puceron de l'orme.
A. ulmi.

2. A. fraxini.
Le Puceron du frêne.
A. fraxini, nigro viridique variegata.

3. A. ſambuci.
Le Puceron du ſureau.
A. ſambuci tota cœruleo-atra.

4. A. roboris.
Le Puceron du chêne.
A. quercûs atro-fuſca.

5. A. aceris.
Le Puceron de l'érable.
A. aceris, viridis, maculis nigris.

6. A. tiliæ.

Le Puceron du tilleul.

A. tiliæ, alis, antennis, pedibuſque nigro punctatis.

7. A. betulæ.

Le Puceron du bouleau.

A. betulæ, marginibus inciſurarum abdominis punctis nigris.

8. A. tanaceti.

Le Puceron de la tanaiſie.

A. tanaceti fuſca, abdomine nigro-cœruleo antice viridi.

9. A. acetoſæ.

Le Puceron de l'oſeille.

A. acetoſæ, atra faſciâ tranſverſâ viridi.

10. A. padi.

Le Puceron du prunier.

A. pruni.

11. A. burſaria.
Le Puceron du peuplier noir.
A. populi nigra lanata.

12. A. fagi.
Le Puceron du hêtre.
A. fagi lanata.

13. A. lactucæ.
Le Puceron du laiteron.
A. ſonchi caudata.

14. A. quercûs.
Le Puceron des écorces à longues trompes.
A. fuſca proboſcide corpore triplo longiore.

LXVIII. CHERMES *Le Kermès.*

Roſtrum pectorale inter primum & ſecundum par femorum.
Alæ duæ maſculis, erectæ.
Abdomen appendicibus ſetaceis.
Fæmina folliculi formam induens.

1. C. polonicus.
Le Kermès des racines.
C. radicum purpureus.
Loc. Habitat polygoni *Knawel* radices.

2. C. heſperidum.
Le Kermès des orangers.
C. heſperidum.

3. C. clematitis.
Le Kermès de la clematite.
C. clematitis oblongus.

4. C. perſicæ.
Le Kermès oblong du pêcher.
C. perſicæ oblongus.

5. C. amygdali.
Le Kermès rond du pêcher.
C. perſicæ rotundus.

6. C. vitis.
Le Kermès de la vigne.
C. vitis oblongus.

7. C. abietis.
Le Kermès du ſapin.
C. abietis rotundus.

8. C. ulmi.
Le Kermès de l'orme.
C. ulmi rotundus.

9. C. tiliæ.
Le Kermès du tilleul.
C. tiliæ hemiſphæricus.

10. C. coryli.
Le Kermès du coudrier.
C. coryli hemiſphæricus.

11. C. quercûs.
Le Kermès rond & brun du chêne.
C. quercûs rotundus fuſcus.

12. C. roboris.
Le Kermès du chêne rond & de couleur panachée.
C. quercûs rotundus, ex albo flaveſcente nigroque variegatus.

13. C. reniformis.
Le Kermès reniforme du chêne.
C. quercûs reniformis.

14. C. ſericeus.
Le Kermès ovale & cotonneux du chêne.
C. quercûs oblongus ſerico albo.

15. C. carpini.
Le Kermès cotonneux du charme.
C. carpini ſerico albo.

16. C. meſpili.
Le Kermès cotonneux du neſlier.
C. meſpili ſerico albo.

17. C. linearis.
Le Kermès en écaille de moule.
C. arborum linearis.

18. C. aceris.
Le Kermès ovale de l'érable.
C. aceris ovatus.

LXIX. COCCUS. *La Cochenille.*

Roſtrum pectorale inter primum & ſecundum par femorum.
Alæ duæ maſculis, erectæ.
Abdomen appendicibus ſetaceis.
Fæmina inſecti formam ſervans.

1. C. adonidum.
La Cochenille des ſerres.
C. adonidum, corpore roſeo, farinaceo, alis ſetiſque niveis.

2. C. phalaridis.
La Cochenille du chien-dent.
C. graminis corpore roſeo.

3. C. ulmi.
La Cochenille de l'orme.
C. ulmi, corpore fuſco, ſerico albo.

Finis primæ Partis.

A01 1455826

XXVIII.
C
57

Digitized by Google